ACSES ニュースレター_２１８５号（2021 年 9 月 29 日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（14 頁）―

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示題 254 号）〈官報〉

梅檀草（センダングサ）

****

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示題 348 号）

［官報］ 令和 3 年 9 月 27 日 号外 第 218 号 75～83 頁

https://kanpou.npb.go.jp/20210927/20210927g00218/20210927g002180075f.html

〇厚生労働省告示第 254 号

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について同項の規定による届出があったので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。

令和 3 年 9 月 27 日　　厚生労働大臣　　田村　憲久

通し番号	名　　称	整理番号
29436	4 - [2 - (アセチルオキシ)プロパン - 2 - イル] - 1 - メチルシクロヘキシル＝アセタート	3-(4)-832
29437	4 - アミノ - N - (4 - アミノフェニル)ベンズアミド・オクタヒドロ - 3H，3”H＝ジスピロ[[4，7]メタノ[2]ベンゾフラン - 5，1’ - シクロペンタン - 3’，5” - [4，7]メタノ[2]ベンソフラン - 1，1”，2’，3，3”(4H，4”H) - ベンタオン重付加物	10-4110
29438	4 - アミノ - N - (4 - アミノフェニル)ベンズアミド・オクタヒドロ - 3H，3″H - ジスピロ[[4，7]メタノ[2]ベンゾフラン - 5，1’ - シクロペンタン - 3’，5″ - [4，7]メタノ[2]ベンソフラン] - 1，1″，2’，3，3″(4H，4″H) - ベンタオン・4，4’ - [1，1 ビフェニル] - 4，4’ - ジイルビス(オキシ)}ジアニリン重付加物	10-4111
29439	4 - アミノ - N - (4 - アミノフェニル)ベンズアミド・オクタヒドロ - 3H，3”H - ジスピロ[[4，7]メタノ[2]ベンソフラン - 5，1’ - シクロペンタン - 3’，5” - [4，7]メタノ[2]ベンゾフラン] - 1，1”，2’，3，3”(4H，4”H) - ベンタオン・4，4’ - {[1，1’ - ビフェニル] - 4，4’ - ジイルビス(オキシ)}ジアニリン・ベンゼン - 1，4 - ジアミン重付加物	10-4112
29440	N^1 - (4 - アミノフェニル)ベンゼン - 1，4 - ジアミン・N，N’ - ビス[2 - (4 - アミノフェニル)エチル]尿素・[5，5’ - ビ - 2 - ベンゾフラン] - 1，1’，3，3’ - テトラオン・tert - ブチル＝[2 - (4 - アミノフェニル)エチル]{[2 - (4 - アミノフェニル)エチル]カルバモイル}カルバマ - ト重付加物	10-4113
29441	アルカンチオール(C=12、分枝型)及びオクタン - 1 - チオールを連鎖移動剤とする，エテニルベンゼン・オキシラニルメチル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート共重合	9-3903

	物	
29442	α－(アルキル(C=18，20，22、直鎖型))－ω－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)・プロパ－2－エン酸・メチル＝プロパ－2－エノアート・2－メチルプロパ－2－エン酸共重合物	9-3904
29443	3－[4－(アルキル(C＝10～13、分枝型))ベンゾイル]－5，7－ジメトキシ－2H－1－ベンゾピラン－2－オン	8-(4)-2179
29444	アンモニウム＝α－{1－(プロパ－2－エン－1－イル)オキシ]テトラデカン－2－イル}－ω－(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)・アンモニウム＝α－{1－[(プロパ－2－エン－1－イル)オキシ]ドデカン－2－イル}－ω－(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)・2－エチルヘキシル＝プロパ－2－エノアート・3－(トリメトキシシリル)プロピル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・N－(ヒドロキシメチル)プロパ－2－エンアミド・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物	9-3905
29445	イソシアナト[(イソシアナトフェニル)メチル]ベンゼン・2－ヒドロキシプロピル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]重付加物	10-4114
29446	5－イソシアナト－1－(イソシアナトメチル)－1，3，3－トリメチルシクロヘキサン・2－イソシアナトエチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・α－{[3－(2－ヒドロキシエトキシ)プロピル]ジ(メチル)シリル}－ω－[3－(2－ヒドロキシエトキシ)プロピル]ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]重付加物	10-4115
29447	5－イソシアナト－1－(イソシアナトメチル)－1，3，3－トリメチルシクロヘキサン・(1，3－ジオキソラン－2－オン・ブタン－1，4－ジオール・ヘキサン－1，6－ジオール・ペンタン－1，5－ジオール重縮合物)・2－ヒドロキシエチル＝プロパ－2－エノアート重付加物	10-4116
29448	2－イソシアナトエチル＝プロパ－2－エノアートと(エチル＝プロパ－2－エノアート・2－ヒドロキシエチル＝プロパ－2－エノアート共重合物)の付加反応生成物	9-3906
29449	[エタン－1，2－ジアミンと(2，2’－ジアゼンジイルビス(2－メチルプロパンニトリル)を開始剤とする，オキシラニルメチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－(ヒドロキシメチル)－2－{[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]メチル}プロパン－1，3－ジイル＝ビス(2－メチルプロパ－2－エノアート)・2，2－ビス{[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]メチル}プロパン－1，3－ジイル＝ビス(2－メチルプロパ－2－エノアート)共重合物)と水の付加反応生成物]と硫酸の塩	9-3907
29450	(エタン－1，2－ジアミンと2－メチルプロパナールの脱水縮合反応生成物)の水素化反応生成物のN^1－(2－メチルプロピル)エタン－1，2－ジアミン精留後の高沸点留分	12-1210
29451	4，4’－[エタン－1，2－ジイルビス(オキシ)]ジアニリン・3a，6a－ジメチルテトラヒドロシクロブタ[1，2－c：3，4－c’]ジフラン－1，3，4，6－テトラオン・tert－ブチル＝[(2，5－ジアミノフェニル)メチル]カルバマート・4，4’－[プロパン－1，3－ジイルビス(オキシ)]ジアニリン・ベンゼン－1，4－ジアミン重付加物	10-4117
29452	1，1’－(エタン－1，2－ジイル)ビス(4－クロロベンゼン)	7-(4)-1422
29453	エタン－1，2－ジイル＝ビス(2－メチルプロパ－2－エノアート)・α－[ブチルジ(メチル)シリル]－ω－{3－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]プロピル}ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]共重合物	9-3908
29454	[3－エチニルベンズアルデヒドとナフタレン－1－カルボアルデヒドとピレン－1－カルボアルデヒドと 2，2’，2”－(ベンゼン－1，3，5－トリイル)トリ－9H－フルオレンの縮合反応生成物](主成分)とその重合物の混合物	9－3909

29455	[3 - エチニルベンズアルデヒドと 2，2’，2” - (ベンゼン - 1，3，5 - トリイル) トリ - 9H - フルオレンの縮合反応生成物] (主成分) とその重合物の混合物	9-3910
29456	(3 - エチルオキセタン - 3 - イル) メチル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノア - ト・1 - シクロヘキシル - 1H - ピロール - 2，5 - ジオン・プロパ - 2 - エン酸共重合物	9-3911
29457	エチル＝2 - シアノプロパノアート	2-(6)-2150
29458	([2 - エチル - 2 - (ヒドロキシメチル) プロパン - 1，3 - ジオール・(9Z) - オクタデカ - 9 - エン酸・ヘキサン二酸・2 - ベンゾフラン - 1，3 - ジオン重縮合物]・1，6 - ジイソシアナトヘキサン・2，2 - ビス (ブロモメチル) プロパン - 1，3 - ジオール・α - ヒドロ - ω - メトキシポリ (オキシエタン - 1，2 - ジイル)・α，α’ - [プロパン - 2，2 - ジイルジ (4，1 - フェニレン)] ビス{ω - ヒドロキシポリ [オキシ (メチルエタン - 1，2 - ジイル)]} 重付加物)・水重縮合物	10-4118
29459	2 - エチル - 2 - (ヒドロキシメチル) プロパン - 1，3 - ジオール・2，2 - ジメチルプロパン - 1，3 - ジオール・2，2，4，4 - テトラメチルシクロブタン - 1，3 - ジオール・ヘキサン二酸重縮合物	10-4119
29460	2 - エチル - 2 - (ヒドロキシメチル) プロパン - 1，3 - ジオールと (12 - ヒドロキシオクタデカン酸重縮合物) のエステル化反応生成物	10-4120
29461	[2 - (4 - エチルフェノキシ) ピリジン - 3 - イル] ボロン酸	8-(1)-4508
29462	2 - (4 - エチルフェノキシ) - 4’ - メトキシ - 3，3’ - ビピリジン	8-(1)-4509
29463	エチル={(1ｒ，4ｒ) - 4 - [(tert - ブトキシカルボニル) アミノ] - 1 - ヒドロキシシクロヘキシル} アセタート	3-(4)-833
29464	エチル＝{(1ｓ，4ｓ) - 4 - [(tert - ブトキシカルボニル) アミノ] - 1 - ヒドロキシシクロヘキシル} アセタート	3-(4)-834
29465	α - (2 - エチルヘキシル) - ω - [({2 - [(2 - メチルプロパ - 2 - エノイル) オキシ] エチル} カルバモイル) オキシ] ポリ [オキシ (1 - オキソヘキサン - 1，6 - ジイル)]・4 - {2 - [(2 - メチルプロパ - 2 - エノイル) オキシ] エトキシ} - 4 - オキソブタン酸共重合物	9-3912
29466	{α - (2 - エチルヘキシル) - ω - [({2 - [(2 - メチルプロパ - 2 - エノイル) オキシ] エチル} カルバモイル) オキシ] ポリ [オキシ (1 - オキソヘキサン - 1，6 - ジイル)]・4 - {2 - [(2 - メチルプロパ - 2 - エノイル) オキシ] エトキシ} - 4 - オキソブタン酸共重合物と 4 - (オキシラニルメトキシ) ブチル＝プロパ - 2 - エノアートのエステル化反応生成物} と [4 - (オキシラニルメトキシ) ブチル＝プロパ - 2 - エノアートと N，N - ジメチルドデカン - 1 - アミンの付加反応生成物] の塩	9-3913
29467	(2E) - 4 - エチルヘプタ - 2，6 - ジエン酸	2-(4)-1349
29468	2 - エチルペンタ - 4 - エナール	2-(8)-911
29469	エチル=4 - {[(N - メチルアニリノ) メチリデン] アミノ} ベンゾアート	4-(7)-2700
29470	2 - エチル - 2 - メチル - 1，3 - ジオキサン - 5 - イル＝プロパ - 2 - エノアート	8-(5)-539
29471	2 - エチル - 2 - メチル - 1，3 - ジオキサン - 5 - オール	8-(5)-540
29472	2 - エチル - 2 - {[(2 - メチルプロパ - 2 - エノイル) オキシ] メチル} プロパン - 1，3 - ジイル＝ビス (2 - メチルプロパ - 2 - エノアート)・オキシジ (エタン - 2，1 - ジイル) ＝ビス (2 - メチルプロパ - 2 - エノアート) 共重合物	9-3914
29473	6 - エテニル - 2，2，6 - トリメチルオキサン - 3 - イル＝アセタート	8-(4)-2180
29474	[(エチニルベンゼン・エテニルベンゼンスルホン酸共重合物) と (1 - tert - ブチル - 4 - エテニルベンゼン重合物) と (2 - メチルブタ - 1，3 - ジエン重合物) のブロック重合物] の水素化反応生成物	9-3915
29475	エテニルベンゼン重合物の乾留による炭素製造時の排ガス冷却物	12-1211

29476	エテニルベンゼン・2 - フェノキシエチル＝プロパ - 2 - エノアート・ブチル＝プロパ - 2 - エノアート・プロパ - 2 - エン - 1 - イル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート・プロパ - 2 - エンニトリル・メチル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート共重合物	9-3916
29477	エテニルベンゼン・(2Ｚ) - ブタ - 2 - エンニ酸・(2Ｚ) - 4 - (2 - メチルプロポキシ) - 4 - オキソブタ - 2 - エン酸共重合物のアンモニウム及びナトリウム塩	9-3917
29478	α - (2 - エトキシ - 1，1 - ジフルオロ - 2 - オキソエチル) - ω - (2 - エトキシ - 1，1 - ジフルオロ - 2 - オキソエトキシ)ポリ[オキシ(ジフルオロメチレン)／オキシ(テトラフルオロエタン - 1，2 - ジイル)]	10-4121
29479	(4Ｚ，8Ｅ) - 13 - オキサビシクロ[10．1．0]トリデカ - 4，8 - ジエンと(4Ｅ，8Ｅ) - 13 - オキサビシクロ[10.1.0]トリデカ - 4，8 - ジエンの混合物	8-(4)-2181
29480	5，5’ - オキシビス(2 - ベンソフラン - 1，3 - ジオン)・1，1’ - [(1ｒ，4ｒ) - シクロヘキサン - 1，4 - ジイル]ジメタンアミン・[5，5’ - ビ - 2 - ベンソフラン] - 1，1’，3，3’ - テトラオン・ヘキサン - 1，6 - ジアミン重付加物	10-4122
29481	オキシラニルメチル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート・ブチル＝プロパ - 2 - エノアート・ブチル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート・プロパ - 2 - エンニトリル共重合物	9-3918
29482	5 - (オキシラニルメトキシ) - 3，4 - ジヒドロキノリン - 2(1H) - オン	8-(1)-4510
29483	2 - オキソ - 2 - [(5 - オキソ - 4 - オキサトリシクロ[4．3．1．$1^{3,8}$]ウンデカン - 2 - イル)オキシ]エチル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート・3 - ヒドロキシアダマンタン - 1 - イル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート・2 - (プロパン - 2 - イル)アダマンタン - 2 - イル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート・1 - (プロパン - 2 - イル)シクロペンチル＝2 - メチルプロパ - 2 - エノアート共重合物	9-3919
29484	オクタデカン - 1 - アミンとオクタン - 1 - アミンとシクロヘキサンアミンと 1，1’ - メチレンビス(4 - イソシアナトベンゼン)の付加反応生成物	7-(41-1423
29485	オクタデカン - 1 - アミンとシクロヘキサンアミンとＮ - シクロヘキシルシクロヘキサンアミンと 1，1’ - メチレンビス(4 - イソシアナトベンゼン)の付加反応生成物	7-(4)-1424
29486	{Ｎ - [4 - ({4 - [(オクタデシルカルバモイル)アミノ]フェニル}メチル)フェニル] - Ｎ’ - オクチル尿素とＮ，Ｎ” - [メチレンジ(4，1 - フェニレン)]ビス(Ｎ’ - オクタデシル尿素)とＮ，Ｎ” - [メチレンジ(4，1 - フェニレン)]ビス(Ｎ’ - オクチル尿素)}を主成分とする，オクタデカン - 1 - アミンとオクタン - 1 - アミンとヘキサデカン - 1 - アミンと 1，1’ - メチレンビス(4 - イソシアナトベンゼン)の反応生成物	7-(4)-1425
29487	1，1’ - (オクタヒドロ - 1H - 4，7 - メタノインデン - 2，5 - ジイル)ジメタノール・(不飽和脂肪酸(Ｃ＝18)の二量体として得られる環式タイマー酸(C=36 を主成分とする。)の水素化反応生成物)・プロパ - 2 - エン酸・2 - メチルプロパ - 2 - エン酸重縮合物	10-4123
29488	1，1’ - (オクタヒドロ - 1H - 4，7 - メタノインデン - 2，5 - ジイル)ジメタノール・プロパ - 2 - エン酸・ベンゼン - 1，3 - ジカルボン酸・2 - メチルプロパ - 2 - エン酸重縮合物	10-4124
29489	1，1，2，2，3，3，4，4 - オクタフルオロ - 1，4 - ビス[(トリフルオロエテニル)オキシ]ブタンを主成分とする，2，2’ - [(オクタフルオロブタン - 1，4 - ジイル)ビス(オキシ)]ビス(2，3，3，3 - テトラフルオロプロパノイル)＝ジフルオリドと 2，2，3，3，4，4 - ヘキサフルオロ - 4 - ({1，1，1，2，3，3 - ヘキサフルオロ - 3 - [(1，1，1，2，3 - ペンタフルオロ - 3 - オキソプロパン - 2 - イル)オキシ]プロパン - 2 - イル}オキシ)ブタノイル＝フルオリドの脱カルボニル＝ジフルオリド反応生成物	2-(12)-330

29490	2，2’－[(オクタフルオロブタン－1，4－ジイル)ビス(オキシ)]ビス(2，3，3，3－テトラフルオロプロパノイル)＝ジフルオリド(主成分)と2，2，3，3，4，4－ヘキサフルオロ－4－(け，1，1，2，3，3－ヘキサフルオロ－3－[(1，1，1，2，3－ベンタフルオロ－3－オキソプロパン－2－イル)オキシ]プロパン－2－イル}オキシ)ブタノイル＝フルオリドの混合物	2-(6)-2151
29491	3－カルバモイル－1－{5－O－[ヒドロキシ(オキシド)ホスホリル]－β－D－リボフラノシル}ピリジン－1－イウム	8-(1)-4511
29492	1－[2－クロロ－4－(4－クロロフェノキシ)フェニル]エタン－1－オン	4-(10)-1505
29493	1^5－クロロ－$N^{10「4」}$－[3－(ジエチルアミノ)プロピル]－$N^{7「5」}$－(4－{[3－(ジエチルアミノ)プロピル]カルバモイル}フェニル)－4^2－ヒドロキシ－1^2－メトキシ－3，8－ジオキソ－2，5，6，9－テトラアザ－4(3，1)－ナフタレナ－1，10(1)，7(1，3)－トリベンゼナデカファン－5－エン－7^5－10^4－ジカルボキシアミドを主成分とする，[5－アミノ－N^1，N^3－ビス(4－{[3－(ジエチルアミノ)プロピル]カルバモイル}フェニル)ベンゼン－1，3－ジカルボキシアミドのジアソ化反応生成物]とN－(5－クロロ－2－メトキシフェニル)－3－ヒドロキシナフタレン－2－カルボキシアミドの反応生成物	5-1565
29494	2－クロロ－4，6－ジフェニル－1，3，5－トリアジン	8-(3)-1552
29495	[(5R)－1－クロロ－4，4－ジフルオロ－5－ヒドロキシ－2，3，4，5－テトラヒドロ－1H－1－ベンソアゼピン－5－イル]メチル＝N－(4－メチルベンゼン－1－スルホニル)－D－フェニルアラニナート	8-(1)-4512
29496	3－クロロ－1，1，1，2－テトラフルオロプロパン	2-(13)-322
29497	(3Z)－3－[(4－クロロフェニル)メチリデン]－2－ベンソフラン－1(3H)－オン	8-(4)-2182
29498	N－{3－[(1E)－5－クロロペンタ－1－エン－1－イル]フェニル}ベンゼンスルホンアミド	4-(8)-348
29499	1－クロロ－1，1，2，2，3－ベンタフルオロプロパン	2-(13)-323
29500	1－クロロ－1，2，2，3，3－ベンタフルオロプロパン	2-(13)-324
29501	[(クロロメチル)オキシラン・4，4’－(プロパン－2，2－ジイル)ジフェノール重縮合物]・4，4’－メチレンジ(シクロヘキサン－1－アミン)重付加物と 4，4’－メチレンジ(シクロヘキサン－1－アミン)の混合物	10-4125
29502	2，2’－ジアゼンジイルビス(2－メチルブタンニトリル)及び2，2’－ジアゼンジイルビス(2－メチルプロパンニトリル)を開始剤とする，2－エチルヘキシル＝プロパ－2－エノアート・2－エチルヘキシル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・エチニルベンゼン・2－(ジエチルアミノ)エチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・1，7，7－トリメチルビシクロ[2．2．1]ヘプタン－2－イル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－(2－ヒドロキシエトキシ)エチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・1－ヒドロキシプロパン－2－イル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－ヒドロキシプロピル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－フェノキシエチル＝プロパ－2－エノアート・tert－ブチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・プロパ－2－エン酸・2－メチルプロパ－2－エン酸・2－メチルプロピル＝プロパ－2－エノアート・2－メチルプロピル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物	9-3920
29503	2，2’－ジアゼンジイルビス(2－メチルプロパンニトリル)を開始剤とする，1－シクロヘキシル－1H－ピロール－2，5－ジオン・2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・4－ヒドロキシフェニル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－メチルプロパ－2－エン酸・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物	9-3921

29504	1－{[(1－シアノ－2－エトキシ－2－オキソエチリデン)アミノ]オキシ}－N，N－ジメチル－1－(モルホリン－4－イル)メタンイミニウム＝ヘキサフルオロ－λ^5－ホスフアヌイド	8-(7)-2035
29505	ジエチル＝2，6－ジメチル－1，4－ジヒドロピリジン－3，5－ジカルボキシラート	8-(1)-4513
29506	シクロヘキサンアミンと4－メチルアニリンと1，1’－メチレンビス(4－イソシアナトベンゼン)の付加反応生成物	7-(4)-1426
29507	5^2，6^3－ジクロロ－2^3，9^3－ジメチル－2^5,9^5－ジオキソ－2^4，2^5，9^4，9^5－テトラヒドロ－3，4，7，8－テトラアザ－2(1，4)，9(4，1)－ジピラゾラ－1，10(1)，5，6(1，4)－テトラベンゼナデカファン－3,7－ジエン－1^4－スルホン酸を主成分とする,[3,3’－ジクロロ[1，1’－ビフェニル]－4，4’－ビス(アミニウム)＝ジクロリドのジアゾ化反応生成物]と 4－(3－メチル－5－オキソ－4，5－ジヒドロ－1H－ピラゾール－1－イル)ベンゼン－1－スルホン酸と 5－メチル－2－フェニル－2，4－ジヒドロ－3H－ピラゾール－3－オンの反応生成物	8-(2)-2901
29508	1，3－ジクロロ－1，1，2，2－テトラフルオロプロパン	2-(13)-325
29509	3，3－ジクロロ－1，1，1，2－テトラフルオロプロパン	2-(13)-326
29510	1，1－ジクロロ－3，3，3－トリフルオロプロパ－1－エン	2-(13)-327
29511	3，3’－ジスルファンジイルジプロパン酸・2，2’－[ナフタレン－1，6－ジイルビス(オキシメチレン)]ビス(オキシラン)・1，3－ビス(オキシラニルメチル)－5－(プロパ－2－エン－1－イル)－1，3，5－トリアジナン－2，4，6－トリオン重付加物	10-4126
29512	5－[(2，4－ジヒドロキシキノリン－3－イル)ジアゼニル]－1，3－ジヒドロ－2H－1，3－ベンゾイミダゾール－2－オン	8-(1)-4514
29513	11－(4，6－ジフェニル－1，3，5－トリアジン－2－イル)－12－([1^1,2^1：2^3,3^1－テルフェニル]－13－イル)－11，12－ジヒドロインドロ[2，3－a]カルバゾール	8-(3)-1553
29514	{[(1M)－2’－[ジフェニルホスファニルパ1,1’－ビナフタレン]－2－イル]ジ(フェニル)－λ^5－ホスフアノンと P，P’－[(1M]－[1，1’－ビナフタレン]－2，2’－ジイル]ビス(ジフェニルホスファン)}を主成分とする，ジフェニル－λ^5－ホスファノンと(1M)－[1，1’－ビナフタレン]－2，2’－ジイル＝ビス(トリフルオロメタンスルホナート)の反応生成物	12-1212
29515	{[(1P)－2’－[ジフェニルホスフアニルバ1,1’－ビナフタレン]－2－イル]ジ(フェニル)－λ^5－ホスファノンとP，P’－[(1P]－[1，1’－ビナフタレン]－2，2’ジイル]ビス(ジフェニルホスファン)}を主成分とする，ジフェニル－λ^5－ホスフアノンと(1P)－[1，1－ビナフタレン]－2，2’－ジイル＝ビス(トリフルオロメタンスルホナート)の反応生成物	12-1213
29516	ジフルオロ[1，1，2，2－テトラフルオロ－2－(フルオロスルホニル)エトキシ]アセチル＝フルオリド	2-(6)-2152
29517	ジベンジル＝(3S，6S，14S，17S)－9－ホルミル－10－ヒドロキシ－6，14－ジメチル－9,11－ビス(2－メチルプロピル)－4,7,13,16－テトラオキソ－3,17－ジ(プロパン－2－イル)－2，5，8，12，15，18－ヘキサアザノナデカンジオアートとベンジル＝[(2S)－3－メチル－1－({(2S)－1－[(4－メチル－1－オキソペンタン－2－イル)アミノ]－1－オキソプロパン－2－イル}アミノ)－1－オキソブタン－2－イル]カルバマートの混合物	4-(6)-475
29518	N－[4－(ジベンゾ[b，d]フラン－4－イル)フェニル]－4－(ナフタレン－1－イル)アニリン	8-(4)-2183
29519	ジメチル＝[(1R，4R)－4－(アセチルオキシ)シクロペンタ－2－エン－1－イル](フルオロ)プロパンジオアート	3-(3)-222

29520	2－(ジメチルアミノ)－2－オキソエチル＝(4－ヒドロキシフェニル)アセタート	4-(7)-2701
29521	ジメチル=2，2’－ジアゼンジイルビス(2－メチルプロパノアート)を開始剤とし，2，2－ビス{[(3－スルファニルプロパノイル)オキシ]メチル}プロパン－1，3－ジイル＝ビス(3－スルファニルプロパノアート)を連鎖移動剤とする，ビシクロ[2．2．1]ヘプタ－2－エン・フラン－2，5－ジオン共重合物(開環重合物を含まないものに限る。)	9-3922
29522	(ジメチル=2，2’－ジアゼンジイルビス(2－メチルプロパノアート)を開始剤とし，2，2－ビス{[(3－スルファニルプロパノイル)オキシ]メチル}プロパン－1，3－ジイル＝ビス(3－スルファニルプロパノアート)を連鎖移動剤とする，ビシクロ[2．2．1]ヘプタ－2－エン・フラン－2，5－ジオン共重合物)と4－ヒドロキシブチル＝プロパ－2－エノアートと 2－(ヒドロキシメチル)－2－{[(プロパ－2－エノイル)オキシ]メチル}プロパン－1，3－ジイル＝ジ(プロパ－2－エノアート)のエステル化反応生成物(開環重合物を含まないものに限る。)	9-3923
29523	ジメチル=2，2’－ジアゼンジイルビス(2－メチルプロパノアート)を開始剤とする，2－(3.5－ジメチル－1H－ピラゾール－1－カルボキシアミド)エチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・[1，1’－ビフェニル]－4－イル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物	9-3924
29524	α－(ジメチルシリル)－ω－ヒドロポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]と 2，2－ビス{[(プロパ－2－エノイル)オキシ]メチル}プロパン－ト 3－ジイル＝ジ(プロパ－2－エノアート)の付加反応生成物	10-4127
29525	[(1R，2S)－2－{[(2，4－ジメチルピリミジン－5－イル)オキシ]メチル}－2－(3－フルオロフェニル)シクロプロピル]メチル＝アセタート	8-(2)-2902
29526	2，6－ジメチルフェノール・2，3，6－トリメチルフェノール・4，4’，4”－(ブタン－1，1，3－トリイル)トリス(2－tert－ブチル－5－メチルフェノール)重縮合物	10-4128
29527	2，6－ジメチルフェノール・2，3，6－トリメチルフェノール・4，4’，4”－(ブタン－1，1，3－トリイル)トリス(2－tert－ブチル－5－メチルフェノール)重縮合物と2－メチルプロパ－2－エノイル＝クロリドのエステル化反応生成物	10-4129
29528	ジメチル＝[(1S)－1－{2－[4－(ただ－ブトキシカルボニル)ピペリジン－1－イル]－4－(トリフルオロメチル)フェニル}－2－(ヒドロキシイミノ)エチル]プロパンジオアート	8-(1)-4515
29529	ジメチル＝フルオロ[(1S，2R，4R，5R)－4－ヒドロキシ－６－オキサビシクロ[3.1.0]ヘキサン－2－イル]プロパンジオアート	8-(4)-2184
29530	ジメチル＝フルオロ[(1R，4R)－4－ヒドロキシシクロペンタ－2－エン－1－イル]プロパンジオアート	3-(3)-223
29531	N，N－ジメチルプロパ－2－エンアミド・2－[({[(ブタン－2－イリデン)アミノ]オキシ}カルボニル)アミノ]エチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・α－[ブチルジ(メチル)シリル]－ω－{3－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]プロピル}ポリ[オキシ(ジメチルシランジイル)]共重合物	9-3925
29532	N，N－ジメチルホスホロアミド酸＝ジクロリド	2-(3)-593
29533	(α－{3－[ジメトキシ(メチル)シリル]プロピル}－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]と 2，2－ビス(ヒドロキシメチル)プロパン－1，3－ジオールの 4：1 エーテル)を主成分とする，(3－クロロプロパ－1－エンと{2，2－ビス(ヒドロキシメチル)プロパン－1，3－ジオールと α－ヒトロ－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]の1：4エーテル}の反応生成物)とジメト	10-4130

	キシ(メチル)シランの反応生成物	
29534	スブチリシンを主成分とする、Bacillus licheniformis(遺伝子組換え)抽出物のプロパン－1，2－ジオール及び水溶液	11-(2)-270
29535	3－スルファニルプロパン－1，2－ジオール・1H，3H－ベンゾ[1，2－ｃ：4，5－ｃ’]ジフラン－1，3，5，7－テトラオン重付加物を連鎖移動剤とする，(3－エチルオキセタン－3－イル)メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・エチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・シクロヘキシル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・4－μが－ブチルシクロヘキシル＝プロパ－2－エノアート・tert－ブチル＝プロパ－2－エノアート・tert－フチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－メチルプロパ－2－エン酸共重合物	9-3926
29536	2，2’－スルファンジイルニ酢酸・1－メチル－3，5－ビス(オキシラニルメチル)－1，3，5－トリアジナン－2，4，6－トリオン重付加物	10-4131
29537	セマグルチド(遺伝子組換え)	11-(4)-976
29538	(セルロースのウロン酸化反応生成物)のアセチル化及びブタノイル化反応生成物	11-(4)-977
29539	テトラオキシドモリブデン酸二銀(Ｉ)	1-(3)-481
29540	テトラデカン酸無水物	2-(6)-2153
29541	テトラフルオロエデン・2，2’－[{1，1，2，3，3－ペンタフルオロ－3－[(トリフルオロエテニル)オキシ]プロパン－1，2－ジイル}ビス(オキシ)]ビス(1，1，2，2－テトラフルオロエタン－1－スルホニル)＝ジフルオリド共重合物	9-3927
29542	テトラフルオロエテン・2，2’－[{1，1，2，3，3－ペンタフルオロ－3－[(トリフルオロエテニル)オキシ]プロパン－1，2－ジイル}ビス(オキシ)]ビス(1，1，2，2－テトラフルオロエタン－1－スルホン酸)共重合物	9-3928
29543	デンプンと 1，3，5－トリアジン－2，4，6－トリアミンとヘキサンニ酸の乾留による炭素製造時の排ガス冷却物	12-1214
29544	(4Ｚ，8Ｅ)－ドデカ－4，8，11－トリエナールと(4Ｅ，8Ｚ)－ドデカ－4，8，11－トリエナールの混合物	2-(8)-912
29545	{1－[3－(トリエトキシシリル)プロピル]－1H－テトラゾール－5－アミンと 2－[3－(トリエトキシシリル)プロピル]－2H－テトラゾール－5－アミン}を主成分とする，(3－クロロプロピル)トリ(エトキシ)シランと 1H－テトラゾール－5－アミンの反応生成物	8-(3)-1554
29546	トリス[4，4，4－トリフルオロ－1－(ナフタレン－2－イル)－1，3－ジ(オキソ－κO)ブタン－2－イド]ユウロピウム	1-(1)-817
29547	3，4，4－トリフルオロ－3－(トリフルオロメチル)－1，2λ^6－オキサチエタン－2，2－ジオン	8-(8)-59
29548	4，4，4－トリフルオロ－1－(ナフタレン－2－イル)ブタン－1，3－ジオン	5-1566
29549	3－(トリフルオロメチル)シクロヘキシル＝4－メチルベンゼン－1－スルホナート	4-(8)-349
29550	トリメチルスルファニウム＝ヨージド	2-(2)-326
29551	Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－1－フェニルメタンアミニウム＝2－({6－[(アダマンタン－1－カルボニル)オキシ]－2－オキソヘキサヒドロ－2H－3，5－メタノシクロペンタ[ｂ]フラン－7－カルボニル}オキシ)－1，1－ジフルオロエタン－1－スルホナート	8-(4)-2185
29552	ナトリウム=(4－[2－(3－エチル－4－メチル－2－オキソ－2，5－ジヒドロ－1H－ピロール－1－カルボキシアミド)エチル]ベンゼン－1－スルホニルル}{[(1ｒ，4ｒ)－4－メチルシクロヘキシル]カルバモイル}アザニド	8-(1)-4516
29553	ナトリウム＝N’－(3－カルボキシプロパノイル)－Ｌ－アルギニナート	2-(4)-1350

29554	ナトリウム＝8－(2－ヒドロキシベンズアミド)オクタノアート	4-(4)-1458
29555	ナトリウム＝2－メチルプロパ－2－エン－1－スルホナート・ビス{N，N－ジメチル－2－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]エタン－1－アミニウム}＝スルフアート・プロパ－2－エンアミド・N－ベンジル－N，N－ジメチル－2－[(プロパ－2－エノイル)オキシ]エタン－1－アミニウム＝クロリド・N－ベンジル－N，N－ジメチル－2－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]エタン－1－アミニウム＝クロリド・メチリデンブタンニ酸共重合物	9-3929
29556	(ナフタレン－2，7－ジオール・フェニルメタノール重縮合物(環置換反応生成物を含むものに限る。))・[1，1'－ビフェニル]－2－オール・ベンゼン－1，3－ジカルボニル＝ジクロリド重縮合物	10-4132
29557	(二亜硫酸ニナトリウムとペルオキシニ硫酸ジアンモニウムと水の反応生成物)を開始剤とする，1－エテニルピロリジン－2－オン・プロパ－2－エンアミド・プロパ－2－エン酸・プロパ－2－エンニトリル・2－メチルプロパ－2－エン酸共重合物のナトリウム塩	9-3930
29558	二亜硫酸ニナトリウムを連鎖移動剤とする，プロパ－2－エン酸・2－メチル－2－(プロパ－2－エンアミド)プロパン－1－スルホン酸共重合物のナトリウム塩	9-3931
29559	バリウム＝(ドデカ－11－エン－1－イル)ブタンジオアート	2-(4)-1351
29560	(ヒアルロン酸のナトリウム塩)のN－[2－({[2－(2，6－ジクロロアニリノ)フェニル]アセチル}オキシ)エチル]ウロンアミド化反応生成物	11-(4)-978
29561	1－({2－[ビス(2－ヒドロキシプロピル)アミノ]エチル}(2－ヒドロキシプロピル)アミノ)プロパン－2－イル=(9Z)－12－ヒドロキシオクタデカ－9－エノアートを主成分とする，1，1'，1"，1'"－(エタン－1，2－ジイルジニトリロ)テトラ(プロパン－2－オール)とヒマシ油脂肪酸の反応生成物	11-(4)-979
29562	{2，2－ビス(ヒドロキシメチル)プロパン－1，3－ジオールとα－ヒドロ－ω－[(プロパ－2－エン－１－イル)オキシ]ポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]の1：4エーテル}を主成分とする，3－クロロプロパ－1－エンと{2，2－ビス(ヒドロキシメチル)プロパン－1，3－ジオールとα－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]の1：4エーテル}の反応生成物	10-4133
29563	N^2，N^3－ビス[(ブタン－1－スルホニル)オキシ]ブタン－2，3－ジイミン	2-(10)-299
29564	{3，6－ビス(4－tert－ブチルフェニル)－2，5－ジヒドロピロロ[3，4－C]ピロール－1，4－ジオンのモノ[(5－アミノ－1，3－ジオキソ－1，3－ジヒドロ－2H－イソインドール－2－イル)メチル]化反応生成物}を主成分とする，5－アミノ－1H－イソインドール－1，3(2H)－ジオンと3，6－ビス(4－tert－ブチルフェニル)－2，5－ジヒドロピロロ[3，4－C]ピロール－1，4－ジオンとホルムアルデヒドの反応生成物	8-(1)-4517
29565	{3，6－ビス(4－tert－ブチルフェニル)－2，5－ジヒドロピロロ[3，4－C]ピロール－1，4－ジオンのモノ[(5－{[3－メチル－5－オキソ－1－(3－スルホフェニル)－4，5－ジヒドロ－1H－ピラゾール－4－イル]ジアゼニル}－1，3－ジオキソ－1，3－ジヒドロ－2H－イソインドール－2－イル)メチル]化反応生成物}を主成分とする，{[5－アミノ－1H－イソインドール－1，3(2H)－ジオンと3，6－ビス(4－tert－ブチルフェニル)－2，5－ジヒドロピロロ[3，4－C]ピロール－1，4－ジオンとホルムアルデヒドの反応生成物]のジアゾ化反応生成物}と3－(3－メチル－5－オキソ－4，5－ジヒドロ－1H－ピラソール－1－イル)ベンゼン－1－スルホン酸の反応生成物	8-(1)-4518
29566	1，1－ビス[(プロパ－2－エン－1－イル)オキシ]ブタン	2-(12)-331

29567	ビス[(2Ｓ)－3－メトキシ－2－メチル－3－オキソプロパン－1－アミニウム]＝スルファート	2-(2)-327
29568	4－ヒドロキシフェニル＝2－メチルプロパ－2－エノアート重合物	9-3932
29569	4－(2－ヒドロキシプロパン－2－イル)－1－メチルシクロヘキシル＝アセタート	3-(4)-835
29570	2－(4－ヒドロキシ－4－メチルシクロヘキシル)プロパン－2－イル＝アセタート	3-(4)-836
29571	4－[(ピリジン－2－イル)オキシ]アニリン	8-(1)-4519
29572	1，1’－[1，4－フェニレンビス(オキシ)]ジベンゼン	4-(14)-486
29573	tert－ブチル＝2－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする，エテニルベンゼン・シクロヘキシル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・1－ヒドロキシプロパン－2－イル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－ヒドロキシプロピル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・ブチル＝プロパ－2－エノアート・ブチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－メチルプロパ－2－エン酸・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物	9-3933
29574	tert－ブチル＝2－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする，エテニルベンゼン・(2Ｚ)－ブタ－2－エン二酸共重合物のアンモニウム塩	9-3934
29575	tert－ブチル=2，2－ジメチルプロパンペルオキソアートを開始剤とする，3，3，4，4，5，5，6，6，7，7，8，8，8－トリデカフルオロオクチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・α－メチル－ω－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)共重合物	9-3935
29576	ブチル=(2Ｓ)－2－[(トリフルオロメタンスルホニル)オキシ]ブタノアート	2-(6)-2154
29577	tert－ブチル＝1－[2－(1－ヒドロキシ－2－ニトロエチル)－5－(トリフルオロメチル)フェニル]ピペリジン－4－カルボキシラート	8-(1)-4520
29578	ブチル=(2Ｓ)－2－ヒドロキシブタノアート	2-(6)-2155
29579	tert－ブチル=1－{2－[(3Ｓ，4Ｒ)－4－(ヒドロキシメチル)ピロリジン－3－イル]－5－(トリフルオロメチル)フェニル}ピペリジン－4－カルボキシラート	8-(1)-4521
29580	tert－ブチル=1－{2－[(3Ｓ，4Ｓ)－4－(ヒドロキシメチル)－5－メトキシ－3，4－ジヒドロ－2Ｈ－ピロール－3－イル]－5－(トリフルオロメチル)フェニル}ピペリジン－4－カルボキシラート	8-(1)-4522
29581	ブチル＝プロパ－2－エノアート・ブチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・4－(プロパ－1－エン－2－イル)フェノール・プロパ－2－エンニトリル共重合物	9-3936
29582	tert－ブチル＝(ベンゼンスルホニル){3－[{1Ｅ)－5－ヨードペンタ－1－エン－1－イル]フェニル}カルバマート	4-(6)-476
29583	ブチル＝(2Ｒ)－2－[3－({(1，3－ベンゾオキサアゾール－2－イル)[3－(4－メトキシフェノキシ)プロピル]アミノ}メチル)フェノキシ]ブタノアート	8-(7)-2036
29584	tert－ブチル＝6－(2－メトキシエトキシ)－5－({2－[(2，4，4－トリメチルペンタン－2－イル)アミノ]ピリジン－4－イル}オキシ)－1Ｈ－インドール－1－カルボキシラート	8-(1)-4523
29585	tert－ブチル=7^6－(2－メトキシエトキシ)－7^1－(メチルカルバモイル)－3－オキソ－7^1Ｈ－6－オキサ－4－アザ－7(5)－インドラ－5(2，4)－ピリジナ－1(4)－ピペリジナ－2(1，4)－ベンゼナヘプタファン－1^1－カルボキシラート	8-(1)-4524
29586	4－{[1－(tert－ブトキシカルボニル)－6－(2－メトキシエトキシ)－1Ｈ－インドール－5－イル]オキシ}ピリジン＝１－オキシド	8-(1)-4525
29587	1－ブトキシナフタレン	5-1567
29588	3－{[(3－{[(3－ブトキシ－2－ヒドロキシプロピル)アミノ]メチル}フェニル)メチル]アミノ}プロパンニトリルを主成分とする，1，1’－(1，3－フェニレン)ジメタン	4-(7)-2702

	アミンと(ブトキシメチル)オキシランとプロパ－2－エンニトリルの反応生成物	
29589	4，4’－(9H－フルオレン－9，9－ジイル)ビス(2－フルオロアニリン)	7-(1)-1021
29590	プロパン－2－イル＝3－(2－ヒドロキシフェニル)プロパノアート	4-(7)-2703
29591	プロパン－2－イル＝3－(2－{[(4E)－5－{3－[N－(tert－ブトキシカルボニル)ベンゼンスルホンアミド]フェニル}ペンタ－4－エン－1－イル]オキシ}フェニル)プロパノアート	4-(6)-477
29592	1，1’－[プロパン－2，2－ジイルビス(4，1－フェニレンオキシ)]ビス(3－スルファニルプロパン－2－オール)を主成分とする，(クロロメチル)オキシラン・4，4’－(プロパン－2，2－ジイル)ジフェノール重縮合物と(ブトキシメチル)オキシランとメタノールと硫化水素の反応生成物	7-(4)-1427
29593	プロパン－2，2－ジイルビス[4，1－フェニレンオキシ(2－ヒドロキシプロパン－3，1－ジイル)]＝ビス{6－[(プロパ－2－イン－1－イル)オキシ]ナフタレン－2－カルボキシラート}を主成分とする，5，5－ジメチル－3，7－ジオキサ－1，9(2)－ビス(オキシラナ)－4，6(1，4)－ジベンゼナノナファンと6－[(プロパ－2－イン－1－イル)オキシ]ナフタレン－2－カルボン酸のエステル化反応生成物	7-(4)-1428
29594	α，α’，α”－(プロパン－1，2，3－トリイル)トリス(ω－{3－[ジメトキシ(メチル)シリル]プロポキシ}ポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)])を主成分とする，ジメトキシ(メチル)シランとα，α’，α”－(プロパン－1，2，3－トリイル)トリス{ω－[(プロパ－2－エン－1－イル)オキシ]ポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]}の反応生成物	10-4134
29595	3－ブロモ－2－(4－エチルフェノキシ)ピリジン	8-(1)-4526
29596	(3E)－6－ブロモ－5，5，6，6－テトラフルオロヘキサ－3－エン－1－オール	2-(8)-913
29597	1－(4－ブロモフェニル)ナフタレン	5-1568
29598	2－ブロモ－4－フルオロ－1－ニドロ－3－(トリフルオロメチル)ベンゼン	4-(12)-986
29599	3－ブロモ－4－メトキシピリジン	8-(1)-4527
29600	1，1，1，3，3，3－ヘキサクロロプロパン	2-(13)-328
29601	N－[4－({4－[(ヘキサデシルカルバモイル)アミノ]フェニル}メチル)フェニル]－N－オクタデシル尿素とN，N”－[メチレンジ(4，1－フェニレン)]ビス(N’－オクタデシル尿素八主成分)の混合物	7-(4)-1429
29602	α，α’，α”，α’”，α””，α’””－(ヘキサン－1,2,3，4,5,6－ヘキサイル)ヘキサキス(ω－{3－[ジメトキシ(メチル)シリル]プロポキシ}ポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)])を主成分とする，ジメトキシ(メチル)シランとα，α’，α”，α”’，α””，α’””－(ヘキサン－1，2，3，4，5，6－ヘキサイル)ヘキサキス{ω－[(プロパ－2－エン－1－イル)オキシ]ポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]}の反応生成物	10-4135
29603	α，α’，α”，α’”，α””，α’””－(ヘキサン－1,2,3,4,5,6－ヘキサイル)ヘキサキス{ω－[(プロパ－2－エン－1－イル)オキシ]ポリ[オキシ(メチルエタン－1，2－ジイル)]}を主成分とする，3－クロロプロパ－1－エンとα，α’，α”，α’”，α””，α’””－(ヘキサン－1,2,3,4,5,6－ヘキサイル)ヘキサキス{ω－ヒドロキシポリ[オキシ(メチルエタン－1,2－ジイル)]}の反応生成物	10-4136
29604	2，2，4，4，6，6，8－ヘプタメチル－8－(3，3，4，4，5，5，6，6，6－ノナフルオロヘキシル)－1，3，5，7，2，4，6，8－テトラオキサテトラシロカン	8-(9)-191
29605	ベルオキシニ硫酸ニカリウムを開始剤とする，エテニルベンゼン・2－メチルプロパ－2－エン酸・メチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート共重合物のアンモニウム及びナトリウム塩	9-3937

29606	α－[3－（4－｛4－[2－ベンジル－2－(ジメチルアミノ)ブタノイル]フェニル｝ピペラジン－1－イル)プロパノイル]－ω－に 3－（4－｛4－[2－ベンジル－2－(ジメチルアミノ)ブタノイル]フェニル｝ピペラジン－1－イル)プロパノイル]オキシ｝ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)を主成分とする，α－(プロパ－2－エノイル)－ω－[(プロパ－2－エノイル)オキシ]ポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)と 2－ベンジル－2－(ジメチルアミノ)－1－[4－(ピペラジン－1－イル)フェニル]ブタン－１－オンの反応生成物	10-4137
29607	1－ベンジルピペリジン－3－イル＝2－[(3－ニトロフェニル)メチリデン]－3－オキソブタノアート	8-(1)-4528
29608	3－[2－（｛(4Ｅ）－5－[3－(ベンゼンスルホンアミド)フェニル]ペンタ－4－エン－1－イル｝オキシ)フェニル]プロパン酸	4-(4)-1459
29609	3－（｛(1，3－ベンゾオキサアゾール－2－イル)[3－(4－メトキシフェノキシ)プロピル]アミノ｝メチル)フェノール	8-(7)-2037
29610	α－(2－(2Ｈ－1，2，3－ベンゾトリアゾール－2－イル)－4－｛2－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]エチル｝フェニル)－ω－｛[(2－(2Ｈ－1，2，3－ベンゾトリアゾール－2－イル)－4－｛2－[(2－メチルプロパ－2－エノイル)オキシ]エチル｝フェノキシ)カルボニル]オキシ｝ポリ｛オキシカルボニルオキシ－1，4－フェニレン[メチル(2－メチルプロピル)メチレン]－1，4－フェニレン｝	10-4138
29611	ホスホリパーゼＣ(ホスホリパーゼＣ産生遺伝子を導入した Bacillus licheniformis)	11-(2)-271
29612	[(2，9(又は 10)－ビス｛3－[(2－ヒドロキシプロピル)スルファモイル]プロパン－１－スルホニル｝－16(又は 17)，23(又は 24)－ビス(3－スルホナトプロパン－1－スルホニル)フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32})銅酸(2－)ニナトリウムと(2，16(又は 17)－ビス｛3－[(2－ヒドロキシプロピル)スルファモイル]プロパン－1－スルホニル｝－9(又は 10)，23(又は 24)－ビス(3－スルホナトプロパン－1－スルホニル)フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32})銅酸(2－)ニナトリウム]を主成分とする，[2，9(又は 10)，16(又は 17)，23(又は 24)－テトラキス(3－スルホプロパン－1－スルホニル)フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}]銅と(2，9(又は 10)，16(又は 17)，23(又は 24)－テトラキス｛3－[(2－ヒドロキシプロピル)スルファモイル]プロパン－１－スルホニル｝フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32})銅と(2，9(又は 10)，16(又は 17)－トリス｛3－[(2－ヒドロキシプロピル)スルファモイル]プロパン－1－スルホニル｝－23(又は 24)－(3－スルホプロパン－1－スルホニル)フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32})銅と(2，9(又は 10)－ビス｛3－[(2－ヒドロキシプロピル)スルファモイル]プロパン－1－スルホニル｝－16(又は 17)，23(又は 24)－ビス(3－スルホプロパン－1－スルホニル)フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32})銅と(2，16(又は 17)－ビス｛3－[(2－ヒドロキシプロピル)スルファモイル]プロパン－1－スルホニル｝－9(又は 10)，23(又は 24)－ビス(3－スルホプロパン－1－スルホニル)フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32})銅と(2－｛3－[(2－ヒドロキシプロピル)スルファモイル]プロパン－1－スルホニル｝－9(又は 10)，16(又は 17)，23(又は 24)－トリス(3－スルホプロパン－1－スルホニル)フタロシアニン－29，31－ジイド－κ^4N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32})銅の混合物のアンモニウム及びナトリウム塩(正塩に限る。)	1-(1)-818
29613	メチル=(2Ｓ)－3－アミノ－2－メチルプロパノアート	2-(6)-2156
29614	メチル=(2Ｓ)－3－(1Ｈ－イミダゾール－1－カルボキシアミド)－2－メチルプロパ	8-(2)-2903

	ノアート	
29615	メチル＝2－[2－クロロ－4－(4－クロロフェノキシ)フェニル]オキシラン－2－カルボキシラート	8-(4)-2186
29616	メチル＝[2－クロロ－4－(4－クロロフェノキシ)フェニル](オキソ)アセタート	4-(7)-2704
29617	rac－メチル=(2R)－2－[2－クロロ－4－(4－クロロフェノキシ)フェニル]－2－ヒドロキシ－3－(1H－1，2，4－トリアゾール－1－イル)プロパノアート	8-(3)-1555
29618	rac－メチル=(2R)－2－[2－クロロ－4－(4－クロロフェノキシ)フェニル]－2－ヒドロキシ－3－(4H－1，2，4－トリアゾール－4－イル)プロパノアート	8-(3)-1556
29619	メチル=(2S)－3－[2，6－ジオキソ－4－(1H－ピラソール－１－イル)－3，6－ジヒドロ－1，3，5－トリアジン－１(2H)－イル]－2－メチルプロパノアート	8-(3)-1557
29620	2－[(2－メチルプロピリデン)アミノ]エタン－1－アミンを主成分とする，エタン－1，2－ジアミンと(エタン－1，2－ジアミンと2－メチルプロバナールの反応生成物)の混合物	2-(10)-300
29621	N^1－(2－メチルプロピル)エタン－1，2－ジアミンを主成分とする，酢酸とN^1－(2－メチルプロピル)エタン－1，2－ジアミンによる2－メチル－1－(2－メチルプロピル)－4，5－ジヒドロ－1H－イミダゾール製造時の低沸点留分	12-1215
29622	メチル＝α－D－マンノピラノシド	11-(4)-980
29623	メチル=(2S)－2－メチル－3－{[(1H－ピラソール－1－カルボキシイミドイル)カルバモイル]アミノ}プロパノアート	8-(2)-2904
29624	2－メチル－1－{2－[5－(4－メチルフェニル)－1H－イミダソール－2－イル]ピベリジン－1－イル}ブタン－1－オン	8-(1)-4529
29625	α，α’，α”，α’”－[({5－[4－({メチル[3－(N－メチルメタンアミニウムイル)プロピル]カルバモイル}オキシ)フェニル]－5－{[(ベンタフルオロフェノキシ)カルボニル]オキシ}ベンタノイル}アザンジイル)ビス[ヘキサン－6，1－ジイルスルファンジイル(2，5－ジオキソピロリジン－3，1－ジイル)(1－オキソプロパン－3，1－ジイル)アザンジイルプロパン－3，1－ジイルオキシプロパン－3，1，2－トリイル]]テトラキス[ω－メトキシポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)]＝トリフルオロアセタートを主成分とする，エタンチオールとα，α’－(3－{3－[3－(2，5－ジオキソ－2，5－ジヒドロ－1H－ピロール－1－イル)プロパンアミド]プロポキシ}プロパン－1，2－ジイル)ビス[ω－メトキシポリ(オキシエタン－1，2－ジイル)]と 3－({[4－(5－[ビス(6－スルファニルヘキシル)アミノ]－5－オキソ－1－{[(ベンタフルオロフェノキシ)カルボニル]オキシ}ベンチル)フェノキシ]カルボニル以メチル)アミノ)－N，N－ジメチルプロパン－1－アミニウム＝トリフルオロアセタートと水の反応生成物	10-4139
29626	3，3’－[メチレンジ(4，1－フェニレン)]ビス[8－(プロパ－2－エン－1－イル)－3，4－ジヒドロ－2H－1，3－ベンゾオキサアジン]を主成分とする，2－(プロパ－2－エン－1－イル)フェノールとホルムアルデヒドと4，4’－メチレンジアニリンの反応生成物	8-(7)-2038
29627	メチレンビス{ナフタレン－1，2，7－トリイルビス[オキシ(2－ヒドロキシプロパン－3，1－ジイル)]}＝テトラキス{6－[(プロパ－2－イン－1－イル)オキシ]ナフタレン－2－カルボキシラート}を主成分とする，{[(クロロメチル)オキシラン・ナフタレン－2，7－ジオール・ホルムアルデヒド重縮合物]と6－ヒドロキシナフタレン－2－カルボン酸の反応生成物}と3－ブロモプロパ－1－インの反応生成物	5-1569
29628	3－(4－メトキシフェノキシ)プロパンニトリル	4-(7)-2705
29629	N－{3－[(1E)－5－ヨードペンタ－1－エン－1－イル]フェニル}ベンゼンスルホ	4-(8)-350

	ンアミド	

********** 以上 **********