ACSES ニュースレター_２２８６号（2022 年 3 月 28 日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（15 頁）―

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示題 84 号）〈官報〉

碇草、錨草（イカリソウ）

****

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示題 84 号）

［官報］ 令和 4 年 3 月 25 日 号外 第 64 号 85～93 頁

https://kanpou.npb.go.jp/20220325/20220325g00064/20220325g000640085f.html

〇厚生労働省告示第 84 号

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について同項の規定による届出があつだあったので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。

令和 4 年 3 月 25 日　　厚生労働大臣　　後藤　茂之

通し番号	名　　称	整理番号
29827	亜鉛＝ビス（ジエチルホスフィナート）	2-(3)-595
29828	亜硝酸ナトリウムと４－カルボキシ－２－ニトロベンゼン－１－ジアゾニウム＝水素＝スルファートと硫酸と硫酸ナトリウムの混合物の水溶液	4-(2)-401
29829	［(アジリジン重付加物）とフラン－２，５－ジオンのアミド化反応生成物］と（フラン－２，５－ジオンとα，α’，α”－（プロパン－１，２，３－トリイル）トリス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)]｝のエステル化反応生成物）とα，α’，α”－（プロパン－１，２，３－トリイル）トリス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)]｝の混合物	10-4166
29830	（アセタート－κO)(アセタート－κ^2O，O’)［１－メチル－４－（プロパン－２－イル）－η^6－ベンゼン］ルテニウム	1-(1)-820
29831	２－［(アセチルオキシ）イミノ］－５－｛［４－（プロパン－２－イル）フェニル］スルファニル｝－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－１－オン	7-(1)-1028
29832	４－(６－｛(２Ｅ)－２－［(アセチルオキシ）イミノ］ヘプタノイル｝－９－（２－エチルヘキシル）－９Ｈ－カルバゾール－３－カルボニル）フェニル＝アセタート	8-(1)-4548
29833	β－Ｎ－アセチルヘキソサミニダーゼ（β－Ｎ－アセチルヘキソサミニダーゼ産生遺伝子を導入した Bacillus licheniformis)	11-(2)-273
29834	アマニ油・桐油・(４－tert－ブチルフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物)・プロパン－１，２，３－トリオール・２－ベンゾフラン－１，３－ジオン・ロジン重縮合物（環化反応生成物を含むものに限る。）	10-4167
29835	N^1－(２－アミノエチル）－N^2－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］エタ	2-(3)-596

	ン－１，２－ジアミン	
29836	４－［２－（２－アミノ－４－オキソ－４，７－ジヒドロ－１Ｈ－ピロロ［２，３－ｄ］ピリミジン－５－イル）エチル］安息香酸	8-(2)-2914
29837	５－［（２－アミノピリジン－４－イル）オキシ］－６－（２－メトキシエトキシ）－Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－１－カルボキシアミド	8-(1)-4549
29838	２－アミノ－３－（ベンジルオキシ）－６－ブロモフェノール	4-(10)-1511
29839	Ｎ－｛２－［（３Ｓ）－３－（アミノメチル）ピペリジン－１－イル］－４－フェノキシ－３－（トリフルオロメチル）フェニル｝－２－（ピリダジン－４－イル）－１，３－チアアゾール－４－カルボキシアミド－塩化水素（１／２）	8-(2)-2915
29840	［α－｛１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］プロパン－２－イル｝－ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）を主成分とする，（アルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）と｛［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物）・オキシラン重付加物］・［アンモニウム＝α－｛１－（アルキル（Ｃ＝10～14、分枝型）オキシ）－３－［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］プロパン－２－イル｝－ω－（スルホナトオキシ）ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）を主成分とする，（アルカノール（Ｃ＝10～14、分枝型）と｛［（プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］メチル｝オキシランの反応生成物）・オキシラン重付加物の硫酸エステル化反応生成物のアンモニウム塩］・２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・｛［エテニルトリ（エトキシ）シランの加水分解反応生成物］重縮合物｝・ナトリウム＝２－メチル－２－（プロパ－２－エンアミド）プロパン－１－スルホナート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸・プロパ－２－エンニトリル・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3975
29841	アンモニウム＝［（４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，９，９，９－トリデカフルオロ－２－ヒドロキシノニル）スルファニル］アセタートを主成分とする，アンモニアとスルファニル酢酸と（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，７ －トリデカフルオロヘプチル）オキシランの反応生成物	12-1217
29842	５ －イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－工ノアート・α－（６－ヒドロキシヘキシル（又は５－ヒドロキシ－３－メチルベンチル））－ω－ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシヘキサン－１，６－ジイル／オキシカルボニルオキシ（３－メチルベンタン－１，５－ジイル）］重付加物	10-4168
29843	［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・３－ヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）－２－メチルプロパン酸・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－１，４－ジイル）重付加物］と（エテニルベンゼン・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）のエステル化反応生成物	9-3976
29844	２－イソシアナトエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと［２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・エテニル＝アセタート・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・１－（モルホリン－４－イル）プロパ－２－エン－１－オン共重合物］の付加反応生成物	9-3977
29845	エタン－１，２－ジイルビス（オキシエタン－２，１－ジイル）＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）・エテニルベンゼン・２－（２－エトキシエトキシ）エチル＝プロパ－２－エノアート・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－	9-3978

	エノアート・２，３－ジヒドロキシ－Ｎ，Ｎ－ジメチル－Ｎ－｛２－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル｝プロパン－１－アミニウム＝クロリド・ドデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・トリデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
29846	エタン-１，２-ジイルビス（オキシエタン-２，１-ジイル）＝ビス（２-メチルプロパ-２-エノアート）・エテニルベンゼン・２-（２-エトキシエトキシ）エチル＝プロパ-２-エノアート・オキシラニルメチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・２，３-ジヒドロキシ-Ｎ，Ｎ -ジメチル- Ｎ -｛２-［（２-メチルプロパ-２-エノイル）オキシ］エチル｝プロパン-１-アミニウム＝クロリド・ドデシル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・トリデシル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・ブチル＝プロパ-２-エノアート・メチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート共重合物	9-3979
29847	２，２’-［エタン-１，２-ジイルビス（オキシ）］ジ（エタン-１-チオール）を連鎖移動剤とする，エタン-１，２-ジイル＝２-メチルプロパ-２-エノアート＝３-オキソブタノアート・３-（トリメトキシシリル）プロピル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・ブチル＝プロパ-２-エノアート共重合物	9-3980
29848	エタン-１，２-ジイル＝ビス（２-ブロモ-２-メチルプロパノアート）	2-(6)-2168
29849	エタン-１，２-ジイル＝ビス（２-ヨード-２-メチルプロパノアート）	2-(6)-2169
29850	エチル＝プロパ-２-エノアート・エチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・ブチル＝プロパ-２-エノアート共重合物	9-3981
29851	エチル＝プロパ-２-エノアート・エテニル＝アセタート・エテニルベンゼン・プロパ-２-エン酸・プロパ-２-エンニトリル・メチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート共重合物	9-3982
29852	２-エチルヘキシル＝２-（２-ヒドロキシ-４-メトキシフェニル）-２Ｈ-１，２，３-ベンゾトリアゾール-５-カルボキシラード	8-(3)-1565
29853	２-エチルヘキシル＝プロパ-２-エノアート・エテニルベンゼン・３-（トリメトキシシリル）プロピル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・２-ヒドロキシエチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・ブチル＝プロパ-２-エノアート・２-メチルプロパ-２-エン酸・メチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート共重合物	9-3983
29854	（２-エチル-２-メチル-１，３-ジオキソラン-４-イル）メチル＝プロパ-２-エノアート・（７-オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン-３-イル）メチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・オキシラニルメチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・１-シクロヘキシル-１Ｈ-ピロール-２，５-ジオン・１-フェニル-１Ｈ-ピロール-２，５-ジオン・４-（プロパ-１-エン-２-イル）フェノール・２-メチルプロパ-２-エン酸・メチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート共重合物	9-3984
29855	エチニル＝クロロアセタート・２-（２-エトキシエトキシ）エチル＝プロパ-２-エノアート・ブチル＝プロパ-２-エノアート・２-メトキシエチル＝プロパ-２-エノアート共重合物	9-3985
29856	［エテニルジ（メトキシバメチル）シランとトリメトキシ（メチル）シランの加水分解反応生成物］重縮合物	10-4169
29857	｛［エテニルジ（メトキシバメチル）シランとトリメトキシ（メチル）シランの加水分解反応生成物］重縮合物｝・Ｓｉ，Ｓｉ’-（１，４-フェニレン）ビス（ジメチルシラン）重付加物	10-4170
29858	４-エチニルフェニル＝メタンスルホナート・４－エテニルフェソール共重合物	9-3986
29859	４ -エテニルベンゼン-１， ２-ジオール・２-オキソ-２-［（５-オキソ-	9-3987

	４－オキサトリシクロ（４．３．１．１^{3,8}）ウンデカン－２－イル）オキシ］エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３，５－ジヒドロキシアダマンタン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－（プロパン－２－イル）シクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
29860	２－エトキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（ジエチルアミノ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（１，３－ジオキソオクタヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル）エチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3988
29861	２－（２－エトキシエトキシ）エチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3989
29862	３－エトキシシクロベンダ－２－エン－１－オン	3-(3)-225
29863	４，４’－オキシジベンソイル＝ジクロリド・１^{3}，３^{3}－ジメチル－２^{3}，２^{4}，２^{5}，２^{6}－テトラヒドロ－２^{2}Ｈ－［１^{1}，２^{1}：２^{1}，３^{1}－テルフェニル］－１^{4}，３^{4}－ジオール・２，６－ジメチルフェノール・ナフタレン－２，６－ジカルボニル＝ジクロリド重縮合物	10-4171
29864	オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと（tert－ブチル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする，シクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキジエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）のエステル化反応生成物	9-3990
29865	オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと（tert－ブチル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする，ベンジル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）のエステル化反応生成物	9-3991
29866	（２－オキソ－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル＝プロパ－２－エノアートを主成分とする，４－（ヒドロキシメチル）－１，３－ジオキソラン－２－オンと水と２－メトキシエチル＝プロパ－２－エノアートの反応生成物	8-(5)-545
29867	（１Ｒ，２Ｓ，５Ｒ）－７－オキソ－２－［(ピペリジン－４－イル）カルバモイル］－１，６－ジアザビシクロ［３．２．１］オクタン－６－イル＝水素＝スルフアート－水（１／１）（別名：レレバクタム水和物）	8-(1)-4550
29868	２－オクタデカンアミドエチル＝プロパ－２－エノアート・Ｎ，Ｎ－ジメチル－２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エタン－１－アミニウム＝アセタート・４－ヒドロキシブチル＝プロパ－２－エノアート・２－ヘキサデカンアミドエチル＝プロパ－２－エノアート共重合物	9-3992
29869	オクタヒドロ－１Ｈ－４，７－メタノインデン－５－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3993
29870	オクタヒドロ－１Ｈ－４，７－メタノインデン－５－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・tert－ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3994
29871	２カリウム＝３－（４－ヒドロキシフェニル）プロパノアート	4-(4)-1461
29872	６－カルボキシ－２－（２－ヒドロキシ－４－メトキシフェニル）－２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアソール＝１－オキシド	8-(3)-1566
29873	６－カルボキシ－２－（４－ヒドロキシ－２－メトキシフェニル）－２Ｈ－１，２，	8-(3)-1567

	３－ベンソトリアゾール＝１－オキシド	
29874	（３Ｓ，４ Ｒ）－３-カルボノクロリドイル－４－（３－フルオロフェニル）－１－（２－メトキシエチル）ピロリジン－１－イウム＝クロリド	8-(1)-4551
29875	キサンタンリアーゼ（キサンタンリアーゼ産生遺伝子を導入した Bacillus licheniformis）	11-(2)-274
29876	キチンの加水分解反応生成物	11-(4)-989
29877	２，２’－｛［１^{1}，２ ^{2}：２ ^{5}，３ ^{1}：３^{6}，４^{1}－クアテルナフタレン］－２^{6}，３^{2}－ジイルビス（オキシ）｝ジ（エタン－１－オール）	5-1570
29878	２，２’－｛［１^{1}，２ ^{2}：２ ^{5}，３ ^{1}： ３^{6}，４^{2}－クアテルナフタレン］－２^{6}，３^{2}－ジイルビス（オキシ）｝ジ（エタン－１－オール）	5-1571
29879	｛（１→６）－Ｄ－グルコピラナンのＯ－［（２Ｒ，３Ｒ）－３－カルボキシラト－２，３－ジヒドロキシプロパノイル］化反応生成物のナトリウム塩｝のアルキル(C=10, 12, 14, 16、直鎖型）グリコシド	11-(4)-990
29880	11－（クロロアセチル）－５，11－ジヒドロ－６Ｈ－ピリド［２，３－ｂ］［１，４］ベンソジアゼピン－６－オン	8-(2)-2916
29881	３－クロロ－４－（２，６－ジフルオロフェニル）－６－メチル－５－フェニルピリダジン	8-(2)-2917
29882	２－｛［１－（４－クロロ－２，５－ジメトキシアニリノ）－１，３－ジオキソブタン－２－イル］ジアゼニル｝－５－メチルベンゼン－１－スルホン酸	4-(5)-732
29883	Ｎ－（４－クロロ－２，５－ジメトキシフェニル）－２－［（１，３－ジオキソ－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－イソインドール－５－イル）ジアゼニル］－３－オキソブタンアミド	8-(1)-4552
29884	１－［（２－クロロ－１，３－チアアゾール－５－イル）メチル］－３－（３，５－ジクロロフェニル）－９－メチル－２，４－ジオキソ－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－ピリド［１，２－a］ピリミジン－１－イウム－３－イド	8-(2)-2918
29885	２－［３－クロロ－５－（１，３，３－トリメチル－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－インドール－２－イリデン）ペンタ－１，３－ジエン－１－イル］－１，３，３－トリメチル－３Ｈ－インドール－１－イウム＝４－メチルベンゼン－１－スルホナート	8-(1)-4553
29886	６－［（４－クロロ－２－ニトロフェニル）ジアゼニル］－２Ｈ－１，３－ベンソジオキソール－５－オール	8-(5)-546
29887	１－クロロ－４－（ノナデカ－１－エン－１－イル）ベンゼン	4-(15)-267
29888	３－クロロ－２－ヒドロキシプロピル＝２－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル＝ベンゼン－１，２－ジカルボキシラードを主成分とする，（クロロメチル）オキシランと（２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと２－ベンゾフラン－１，３－ジオンの反応生成物）の反応生成物	4-(7)-2711
29889	（１Ｒ）－１－（２－クロロフェニル）－２－（２Ｈ－テトラゾール－２－イル）エチル＝カルバマート	8-(3)-1568
29890	１－（４－クロロフェニル）ノナデカン－１－オール	4-(10)-1512
29891	Ｎ－［５－（３－クロロフェニル）－３－ヒドロキシピリジン－２－カルボニル］グリシン	8-(1)-4554
29892	Ｎ－（４－クロロフェニル）－４－メトキシ－２－メチルアニリン	4-(12)-987
29893	（３Ｓ，４ Ｒ）－Ｎ－クロロ－４－（３－フルオロフェニル）－１－（２－メトキシエチル）ピロリジン－３－カルボキシアミドを主成分とする，次亜塩素酸ナトリウムと（３Ｓ，４Ｒ）－４－（３－フルオロフェニル）－１－（２－メトキシエチ	8-(1)-4555

	ル）ピロリジン－３－カルボキシアミドの反応生成物	
29894	［(クロロメチル）オキシラン・３，３’，５，５’－テトラメチル［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジオール・［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジオール重縮合物］とプロパン－２－オールと水の付加反応生成物	10-4172
29895	（クロロメチル）オキシランと｛［（クロロメチル）オキシラン・ドデカン－１，12-ジオール重縮合物］・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重付加物｝の縮合反応生成物	10-4173
29896	三ナトリウム＝２－ヒドロキシプロパン－１，２，３-トリカルボキシラート－水（１／２）と硝酸ナトリウムと水酸化ナトリウムと二塩化コバルト（H）－水（１／６）と二塩化鉄（H）－水（１／４）の反応生成物から［四酸化コバルト（Ⅱ）二鉄（Ⅲ）を主成分とする固相］を固液分離して得られるろ液	12-1218
29897	（OC－６－22）－ジ（アセタート－κ^{2}O，O’）｛P，P’－［(１M）－［１，１’－ビナフタレン］－２，２’－ジイル］ビス［ビス（３，５－ジメチルフェニル）ホスファン－κP］｝ルテニウム	1-(1)-821
29898	２，２’－ジアゼンジイルビス(２，４－ジメチルペンタンニトリル）を開始剤とする，２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノア－ト・ジエチル＝（｛２－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］エチル｝カルバモイル）プロパンジオアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物	9-3995
29899	［２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルブタンニトリル）を開始剤とする，エチル＝プロパ－２－エノアート・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物］とプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成物	9-3996
29900	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とし，アルカンチオール（C＝10～13、直鎖型及び分枝型）を連鎖移動剤とする，オクタヒドロ－１H－４，７－メタノインデン－５－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１，７，７－トリメチルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル＝プロパ－２－エノアート・α－フェニル－ω－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)・４－（プロパ－１－エン－２－イル）フェノール・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物	9-3997
29901	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，２－エチルアダマンタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・(２－オキソ－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソヘキサヒドロ－２H－３，５－メタノシクロペンタ［b］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3998
29902	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，１－エチルシクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・(２－オキソ－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソヘキサヒドロ－２H－３，５－メタノシクロペンタ［b］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-3999
29903	２，２’－ジアゼンジイルビス(２－メチルプロパンニトリル)を開始剤とする，（２－オキソ－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソヘキサヒドロ－２H－３，５－メタノシクロペンタ［b］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル	9-4000

	＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
29904	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５－メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３－（２－ヒドロキシエトキシ）アダマンタン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルアダマンタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロベンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4001
29905	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５－メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルアダマンタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4002
29906	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，１－シクロヘキシル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4003
29907	１，３－ジイソシアナト－２－メチルベンゼン・２，４－ジイソシアナト－１－メチルベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α，α’－［プロパン－２，２－ジイルジ(４，１－フェニレン)］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)］重付加物	10-4174
29908	（１，３－ジエテニル－１，１，３，３－テトラメチルジシロキサンとテトラエチル＝シリカードとヘキサメチルジシロキサンの加水分解反応生成物）重縮合物	10-4175
29909	［３，７－ジオキサ－１，９（２）－ビス（オキシラナ）－５（９，９）－フルオレナ－４，６（１，４）－ジベンゼナノナファン・(２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアートと［５，５’－ビ－２－ベンソフラン］－１，１’，３，３’－テトラオンの付加反応生成物)・プロパ－２－エン酸重付加物］と１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２－ベンゾフラン－５－カルボン酸の付加反応生成物	10-4176
29910	２，６－ジオキサ－１，７（５）－ビス([２］ベンゾフラナ）－４（９，９）－フルオレナ－３，５(１，４)－ジベンゼナヘプタファン－１^{3}，１^{4}，７^{3}，７^{3}－テトラオン	8-(4)-2199
29911	２，６－ジオキサ－４（９，９）－フルオレナ－１，７（１)，３，５（１，４）－テトラベンゼナヘプタファン－１^{3}，１^{4}，７^{3}，７^{4}－テトラカルボニトリル	7-(1)-1029
29912	２，６－ジオキサ－４（９，９）－フルオレナ－１，７（１)，３，５（１，４）－テトラベンゼナヘプタファン－１^{3}，１^{4}，７^{3}，７^{3}－テトラカルボン酸	7-(1)-1030
29913	９，10－ジオキソ－５－［(プロパン－２－イル）アミノ］－９，１０－ジヒドロアントラセン－１－スルホン酸	6-351
29914	３，５－ジクロロ－４－メトキシ安息香酸	4-(4)-1462
29915	Ｎ－［１，３－ジヒドロキシ－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－２－イル］グリシン	2-(4)-1356
29916	５，12－ジヒドロキノリノ［２，３－ｂ］アクリジン－７，14－ジオンの(１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル）メチル化及びスルホン化反応生成物	8-(1)-4556
29917	ジフェニル(２，４，６－トリメチルフェニル）スルフアニウム＝２，４－ジフルオロベンゼン－１－スルホナート	4-(2)-402
29918	ジフェニル(２，４，６－トリメチルフェニル）スルファニウム＝トリフルオロアセタート	4-(2)-403

29919	ジフェニルホスファン	4-(3)-245
29920	N，N－ジブチル－N－（1－ヒドロキシプロパン－２－イル（又は２－ヒドロキシプロピル））ブタン－１－アミニウム＝２－メチルベンタノア－トとα－［1－(N，N－ジブチルブタン－１－アミニウムイル）プロパン－２－イル（又は２－(N，N－ジブチルブタン－１－アミニウムイル）プロピル)］－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］＝２－メチルベンタノアートの混合物	10-4177
29921	３－（4，4－ジフルオロシクロヘキシル）ベンタン－３－オール	3-(4)-840
29922	α－{1，1－ジフルオロ－２－ヒドロキシ－５－（トリメトキシシリル）－２－［3－（トリメトキシシリル）プロピル］ベンチル}－ω－({1，1－ジフルオロ－２－ヒドロキシ－５－（トリメトキシシリル）－２－［3－（トリメトキシシリル）プロピル］ベンチル}オキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエタン－1，2－ジイル)］とα－{1，1－ジフルオロ－２－ヒドロキシ－５－（トリメトキシシリル）－２－［3－（トリメトキシシリル）プロピル］ベンチル}－ω－（トリフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエタン－1，2－ジイル)］とα－{1，1－ジフルオロ－２－ヒドロキシ－５－（トリメトキシシリル）－２－［3－（トリメトキシシリル）プロピル］ベンチル}－ω－（ベンタフルオロエトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエタン－1，2－ジイル)］とα－（トリフルオロメチル）－ω－（トリフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）ノオキシ（テトラフルオロエタン－1，2－ジイル)］とα－（ベンタフルオロエチル）－ω－（トリフルオロメトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）／オキシ（テトラフルオロエタン－1，2－ジイル)］とα－（ベンタフルオロエチル）－ω－（ベンタフルオロエトキシ）ポリ［オキシ（ジフルオロメチレン）ノオキシ（テトラフルオロエタン－1，2－ジイル)］の混合物	10-4178
29923	(1^{1}s，1^{4}r)－3^{2}，3^{3}－ジフルオロ－3^{4}－プロポキシ－1^{4}－プロピル－1^{1}，1^{2}，1^{3}，1^{4}，1^{5}，1^{6}，2^{1}，2^{2}，2^{3}，2^{6}－デカヒドロ－1^{1}，2^{1}：2^{4}，3^{1}－テルフェニル	7-(3)-1154
29924	ジプロピルジホスホン酸（主成分）とプロピルホスホン酸の混合物	2-(3)-597
29925	ジブロモジ（クロロ）メタン	2-(13)-329
29926	2，2’－［(2，7－ジブロモ－9H－フルオレン－9，9－ジイル）ビス（ナフタレン－6，2－ジイルオキシ)］ジ（エタン－1－オール)	7-(1)-1031
29927	2，3－ジブロモプロパ－1－エン	2-(13)-330
29928	2－（ジベンソ［b，d］フラン－4－イル）－H－［4－（ナフタレン－1－イル）フェニル］アニリン	8-(4)-2200
29929	ジメチル= 2，2（{5 －アセトアミド－4－［(2－クロロ－4，6－ジニトロフェニル）ジアゼニル］－2－メトキシフェニル}アザンジイル）ジアセタートを主成分とする，(2－クロロ－4，6－ジニトロアニリンのジアゾ化反応生成物）とジメチル＝2，2’－［(5－アセトアミド－2－メトキシフェニル）アザンジイル］ジアセタートの反応生成物	4-(7)-2712
29930	2－（ジメチルアミノ）エチル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・ベンジル＝2－メチルプロパ－2－エノアート・2－メチルプロパ－2－エン酸共重合物	9-4004
29931	ジメチル= 2，2’－ジアゼンジイルビス（2－メチルプロパノアート）を開始剤とし，2，3，3，4，4，5－ヘキサメチルヘキサン－2－チオールを連鎖移動剤とする，1－エチルシクロヘキシル＝プロパ－2－エノアート・4－エテニルフ	9-4005

	ェノール・エテニルベンゼン・２，５－ジメチルヘキサン－２，５－ジイル＝ジ（プロパ－２－エノアート）共重合物	
29932	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とし，２，３，３，４，４，５－ヘキサメチルヘキサン－２－チオールを連鎖移動剤とする，１－エチルシクロヘキシル＝プロパ－２－エノアート・４－エテニルフェノール・２，５－ジメチルヘキサン－２，５－ジイル＝ジ（プロパ－２－エノアート）共重合物	9-4006
29933	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とし， ２，３，３，４，４，５－ヘキサメチルヘキサン－２－チオールを連鎖移動剤とする，４－エテニルフェノール・３－ヒドロキシアダマンタン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4007
29934	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノア－ト）を開始剤とする，（アントラセン－９－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－ブトキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4008
29935	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，２－エチルアダマンタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソオキソラン－３－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－［（１，１－ジオキソヘキサヒドロ－１Ｈ－１λ^{6}－３，５－メタノシクロペンタ［Ｃ］［１，２］オキサチオール－７－イル）オキシ］－２－オキソエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4009
29936	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，１－エチルシクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－［（１，１－ジオキソヘキサヒドロ－１Ｈ－１λ６－３，５－メタノシクロペンタ［Ｃ］［１，２］オキサチオール－７－イル）オキシ］－２－オキソエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３－ヒドロキシアダマンタン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4010
29937	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，１－エチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・４－エテニルフェノール共重合物	9-4011
29938	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，１－エテニルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・４－エテニルフェノール共重合物	9-4012
29939	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，２－オキソオキソラン－３－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－［（１，１－ジオキソヘキサヒドロ－１Ｈ－１λ^{6}－３，５－メタノシクロペンタ［Ｃ］［１，２］オキサチオール－７－イル）オキシ］－２－オキソエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３－ヒドロキシアダマンタン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（プロパン－２－イル）アダマンタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4013
29940	ジメチル= ２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，１－シクロヘキシル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・２－ヒドロキシ	9-4014

	エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・４－ヒドロキシフェニル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
29941	４，４－ジメチル－２，６－ジオキサ－１（４），７（５）－ビス（［２］ベンゾフラナ）－３，５（１，４）－ジベンゼナヘプタファン－１^{1}，１^{3}，７^{1}，７^{3}－テトラオンと４，４－ジメチル－２，６－ジオキサ－１，７（５）－ビス（［２］ベンゾフラナ）－３，５（１，４）－ジベンゼナヘプタファン－１^{1}，１^{3}，７^{1}，７^{3}－テトラオン（主成分）と１^{2}，４，４－トリメチル－１^{1}Ｈ－２，６－ジオキサ－１（５）－イソインドラ－７（５）－［２］ベンゾフラナ－３，５（１，４）－ジベンゼナヘプタファン－１^{1}，１^{3}（１^{2}Ｈ），７^{1}，７^{3}－テトラオンの混合物	8-(4)-2201
29942	［（４Ｓ）－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソラン－４－イル］メチル＝３－（４－｛［（２　Ｓ）－オキシラニル］メトキシ｝フェニル）プロパノアート	8-(5)-547
29943	［（４Ｓ）－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソラン－４－イル］メチル＝３－（４－ヒドロキシフェニル）プロパノアート	8-(5)-548
29944	［（４Ｓ）－２，　２－ジメチル－１，３－ジオキソラン－４－イル］メチル＝メタンスルホナート	8-(5)-549
29945	（２Ｓ）－３－［４－（３－｛［（４　Ｓ）－２，２－ジメチル－１，３－ジオキソラン－４－イル］メトキシ｝－３－オキソプロピル）フェノキシ］－２－ヒドロキシ－Ｎ－［２－（モルホリン－４－カルボキシアミド）エチル］プロパン－１－アミニウム＝クロリド	8-(7)-2042
29946	ジメチル＝３，　３’－（２，７－ジフェニル－９Ｈ－フルオレン－９，９－ジイル）ジプロパノアート	7-(1)-1032
29947	α－［３－（３－｛ジメチル［２－（トリメトキシシリル）エチル］シリル｝－Ｈ－メチルアニリノ）－１，１，１，２－テトラフルオロ－３－オキソプロパン－２－イル］－ω－フルオロポリ｛オキシトリフルオロ（トリフルオロメチル）エタン－１，２－ジイル］｝を主成分とする，α－（３－｛３－［エテニルジ（メチル）シリル］－Ｎ－メチルアニリノ｝－１，１，１，２－テトラフルオロ－３－オキソプロパン－２－イル）－ω－フルオロポリ｛オキシ［トリプルオロ（トリフルオロメチル）エタン－１，２－ジイル］｝とトリメトキシシランの付加反応生成物	10-4179
29948	ジメチル＝（１Ｒ，２Ｓ，３Ｒ，４Ｓ）－ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－５－エン－２，３－ジカルボキシラート	7-(2)-394
29949	硝酸とビス（硝酸）白金（Ⅱ）の混合物	1-(3)-483
29950	ストロンチウム＝５－［（５－クロロ－４－メチル－２－スルホナトフェニル）ジアゼニル］－６－ヒドロキシナフタレン－２－スルホナート	5-1572
29951	セリウム＝トリス（２－エチルヘキサノアート）とネオジム＝トリス（２－エチルヘキサノアート）とプラセオジム＝トリス（２－エチルヘキサノアート）とランタン＝トリス（２－エチルヘキサノアート）の混合物	2-(4)-1357
29952	デカン－１，10－ジオール重縮合物	10-4180
29953	テトラメチル＝（１Ｒ，１Ｓ，２Ｓ，２’Ｓ，３Ｒ，３’Ｒ，４Ｓ，４’Ｓ，５Ｓ，５’Ｓ）－５，５’－（１，４－フェニレン）ジ（ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２，３－ジカルボキシラート）	7-(2)-395
29954	［デンプンの３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルメタンアミニウムイル）－２－ヒドロキシプロピルエーテル化反応生成物の塩化物塩］のリン酸エステル化反応生成物のナトリウム塩（正塩に限る。）	11-(4)-991
29955	｛トリエトキシシランとトリス［３－（トリメトキシシリル）プロピル］－１，３，	10-4181

	５－トリアジナントリオンとトリメトキシ（フェニル）シランとトリメトキシ（メチル）シランの加水分解反応生成物｝重縮合物	
29956	（トリオキソ－１，３，５－トリアジナン－１，３，５－トリイル）トリス（２－ヒドロキシプロパン－３，１－ジイル）＝トリス｛６－［(プロパ－２－イン－１－イル）オキシ］ナフタレン－２－カルボキシラート｝を主成分とする，３，４－ジヒドロキシ安息香酸とトリス（オキシラニルメチル）－１，３，５－トリアジナントリオンと６－［(プロパ－２－イン－１－イル）オキシ］ナフタレン－２－カルボン酸の反応生成物	8-(3)-1569
29957	トリス｛２－［３－クロロ－５－(１，３，３－トリメチル－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－インドール－２－イリデン) ベンダ－１，３－ジエン－１－イル］－１，３，３－トリメチル－３Ｈ－インドール－１－イウム｝＝テトラコンタオキシド（リン十ニタングステン）アート	8-(1)-4557
29958	１，３，５-トリス（tert－ブチルスルファニル）ベンゼン	4-(14)-488
29959	１，１，１－トリフルオロ－３－メチル－２－（トリフルオロメチル）ブタン－２，３－ジオール	2-(8)-919
29960	(２，２，３－トリメチルシクロベンダ－３－エン－１－イル）アセトニトリル	3-(3)-226
29961	［トリメトキシ（フェニル）シランの加水分解反応生成物］重縮合物	10-4182
29962	ナトリウム＝テトラキス（ヘプタフルオロナフタレン－２－イル）ボラヌイド（主成分）とナトリウム＝トリス (ヘプタフルオロナフクレシ－２－イルバヒドロキシ) ボラヌイドの混合物	5-1573
29963	ナトリウム＝ヒドロキシメタンスルフィナート及び２－メチルプロパン－２－ベルオキソールを開始剤とする，エテニルベンゼン・(ナトリウム＝ヒドロキシメタンスルフィナート及び２－メチルプロパン－２－ベルオキソールを開始剤とする，アンモニウム＝α，α’－（オキシドホスホリル）ビス｛ω－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］｝・ジアンモニウム＝α－（２－メチルプロパ－２－エノイル）－ω－（ホスホナトオキシ）ポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］・α－ヒドロ－ω－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］・ブタ－１，３－ジェン共重合物)・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4015
29964	４－（ノナデカ－１－エン－１－イル）－Ｎ－オクタデシルアニリン	4-(12)-988
29965	バリウム＝５－［(５－クロロ－４－メチル－２－スルホナトフェニル）ジアゼニル］－６－ヒドロキシナフタレン－２－スルホナート	5-1574
29966	バリウム＝３－ヒドロキシ－４－［(２－メチル－４－スルホナトフェニル）ジアゼニル］ナフタレン－２－カルボキシラート	5-1575
29967	［１，１’－ビ（シクロペンタン)］－２－イル＝ブタ－２－エノアート	7-(3)-1155
29968	２－［(４－｛４－［(ビス｛［３－（ジエチルアミノ）プロピル］アミノ｝－１，３，５－トリアジニル）アミノ］ベンゼン－１－スルホニル｝フェニル）ジアゼニル］－３－オキソ－Ｎ－（２－オキソ－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－１，３－ベンゾイミダゾール－５－イル）ブタンアミド	8-(3)-1570
29969	ビス（Ｎ－｛３－［４－（２，３－ジヒドロキシプロポキシ）ブトキシ］－２－ヒドロキシプロピル｝－６－（ジメチルアミノ）－Ｎ，Ｎ－ジメチルヘキサン－１－アミニウム）＝スルフアートを主成分とする，(｛N^1，N^1，N^6，N^6－テトラメチルヘキサン－１，６－ジアミンと２，２’－［ブタン－１，４－ジイルビス（オキシメチレン)］ビス（オキシラン）の第四級アンモニウム塩形成反応生成物｝と	2-(2)-331

	水の付加反応生成物）と硫酸の塩	
29970	ビス（硝酸）白金（H）	1-(3)-484
29971	１，３－ビス（２－ヒドロキシエチル）－１Ｈ－イミダソール－３－イウム＝ブロミド	8-(2)-2919
29972	{３，６－ビス(４ －tert－ブチルフェニル）－２，５－ジヒドロピロロ［３，４ －ｃ］ピロール－１，４－ジオンのモノ［(５－ {[クロロ（２－スルホアニリノ）－１，３，５－トリアジニル］アミノ－１，３－ジオキソ－１，３－ジヒドロ－２Ｈ－イソインドール－２－イル）メチル］化反応生成物} を主成分とする，［５－アミノ－１Ｈ－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオンと３，６－ビス(４ －tert－ブチルフェニル）－２，５－ジヒドロピロロ［３，４－c]ピロール－１，４－ジオンとホルムアルデヒドの反応生成物）と２－アミノベンゼン－１－スルホン酸とトリクロロ－１，３，５－トリアジンの反応生成物	8-(3)-1571
29973	（４Ｚ）－４－（ヒドロキシイミノ）－１－［５－Ｏ－（２－メチルプロパノイル）－β－Ｄ－リボフラノシル］－３，４－ジヒドロピリミジン－２（１Ｈ）－オン（別名：モルヌピラビル）	8-(2)-2920
29974	（４Ｚ）－９－ヒドロキシ－５，９－ジメチルデカ－４－エナールと（４Ｅ）－９－ヒドロキシ－５，９－ジメチルデカ－４－エナールの混合物	2-(8)-920
29975	（２Ｚ，４Ｅ）－５－［(１Ｓ）－１－ヒドロキシ－２，６，６－トリメチル－４－オキソシクロヘキサ－２－エン－１－イル］－３－メチルペンタ－２，４－ジエン酸	3-(4)-841
29976	３－ヒドロキシブタン酸・４－ヒドロキシブタン酸重縮合物	10-4183
29977	１－ヒドロキシ－５－［(プロパン－２－イル）アミノ］アントラセン－９，10－ジオン	6-352
29978	Ｎ－{(２Ｓ，３Ｓ）－１－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロパノイル）－２－［(２，３’，５’－トリフルオロ［１，１ビフェニル］－３－イル）メチル］ピロリジン－３－イル} メタンスルホンアミド－水（２／３）	8-(1)-4558
29979	４－［(２－ヒドロキシ－４－メトキシフェニル）ジアゼニル］－３－ニトロ安息香酸と４－［(４－ヒドロキシ－２－メトキシフェニル）ジアゼニル］－３－ニトロ安息香酸（主成分）の混合物	4-(4)-1463
29980	（２－ヒドロキシ－４－メトキシフェニル）－２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－５－カルボン酸	8-(3)-1572
29981	２ －（４－ヒドロキシ－２－メトキシフェニル）－２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－５－カルボン酸	8-(3)-1573
29982	α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ｛オキシ［(Ｓ）－カルボキシメチレン］オキシ［(１Ｒ，２Ｒ）－２－カルボキシ－１－（ヒドロキシメチル）エタン－１，２－ジイル］／オキシ［(２Ｓ，３Ｒ，４Ｒ，５Ｓ ，６Ｒ）－ ３，４－ジヒドロキシ－６－（ヒドロキシメチル）オキサン－２，５－ジイル］} を主成分とする，セルロースの酸化反応生成物	11-(4)-992
29983	（α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ｛オキシ［(５）－カルボキシメチレン］オキシ［(１Ｒ，２Ｒ）－２－カルボキシ－１－（ヒドロキジメチル）エタン－１，２－ジイル］／オキシ［(２Ｓ，３Ｒ，４Ｒ，５Ｓ，６Ｒ）－３，４－ジヒドロキシ－６－（ヒドロキシメチル）オキサン－２，５－ジイル］} を主成分とする，セルロースの酸化反応生成物）のナトリウム塩	11-(4)-993
29984	Ｐ，Ｐ’－［(１Ｍ）－［１，１’－ビナフタレン］－２，２’－ジイル］ビス［ビス（３，５－ジメチルフェニル）ホスファン］	7-(1)-1033

29985	［1，1’-ビフェニル］-４-カルボアルデヒド・N-フェニルアニリン重縮合物	10-4184
29986	（1R）-１-フェニルエタン-１-アミニウム=（２R）-６-ヒドロキシ-２，５，７，８-テトラメチル-３，４-ジヒドロ-２H-１-ベンソピラン-２-カルボキシラート	8-(4)-2202
29987	フェニル＝メチルカルバマート	4-(6)-480
29988	（3aR，３a’R，4S，4’S，5S，5’S，7R，7aS，7a’S）-５，5’-（1，４-フェニレン）ビス（ヘキサヒドロ-4，７-メタノ-２-ベンソフラン-１，３-ジオン）	8-(4)-2203
29989	フェノール・（1，２，３，４，６-ペンタキス-O-｛3，４-ジヒドロキシ-５-［(3，４，５-トリヒドロキシベンゾイル）オキシ］ベンゾイル｝-D-グルコピラノースを主成分とする，タンニン（ワットル由来)）・ホルムアルデヒド重縮合物	10-4185
29990	tert-ブチル=（{(３S)-１-［6-アミノ-３-フェノキシ-２-（トリフルオロメチル）フェニル］ピペリジン-３-イル｝メチル）カルバマート	8-(1)-4559
29991	tert-ブチル=（{(３S)-１-［3-オキソ-５^{3}-（トリフルオロメチル）-６-オキサ-４-アザ-１（4）-ピリダジナ-２(2，4)-［1，3］チアアゾラ-５（1，4），７（1）-ジベンゼナヘプタファン-５^{2}-イル］ピペリジン-３-イル｝メチル）カルバマート	8-(2)-2921
29992	tert-ブチル=（{(３S)-1-［6-ニドロ-３-フェノキシ-２-（トリフルオロメチル）フェニル］ピペリジン-３-イル｝メチル）カルバマート	8-(1)-4560
29993	tert-ブチル=（３S）-４-（4-フルオロイソキノリン-５-スルホニル）-３-メチル-1，４-ジアゼパン-１-カルボキシラード	8-(2)-2922
29994	tert-ブチル=（２S，３S）-２-［(3-ブロモ-２-フルオロフェニル）メチル］-３-（メタンスルホンアミド）ピロリジン-１-カルボキシラ-ト	8-(1)-4561
29995	２-（tert-ブチルベルオキシ）-２-メチルプロパン及びtert-ブチル＝ベンゼンカルボベルオキソア-トを開始剤とする，エチル＝プロパ-２-エノア-ト・２-エチルヘキシル＝プロパ-２-エノアート・rel-（1R，2R，4R）-1，７，７-トリメチルビシクロ［2．2．1］ヘプタン-２-イル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・ブチル＝プロパ-２-エノアート・プロパ-２-エン酸・メチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート共重合物	9-4016
29996	tert-ブチル=（２S，３S）-3-（メタンスルホンアミド）-２-［(2，3’，５’-トリフルオロ［1，1’-ビフェニル］-３-イル）メチル］ピロリジン-１-カルボキシラート	8-(1)-4562
29997	２-tert-ブチル-５-メチル-２-プロピル-2，５-ジヒドロフラン	8-(4)-2204
29998	3，3’-（9H-フルオレン-9，９-ジイル）ジプロパンアミド	7-(1)-1034
29999	４-フルオロイソキノリン-２-イウム＝水素＝スルファート	8-(1)-4563
30000	（３S，４R）-４-（3-フルオロフェニル）-１-（2-メトキシエチル）ピロリジン-３-アミン	8-(1)-4564
30001	N-［(３S，４R）-４-（3-フルオロフェニル）-１-（2-メトキシエチル）ピロリジン-３-イル］-N’-［4-メチル-３-（2-メチルピリミジン-５-イル）-１-フェニル-1H-ピラソール-５-イル］尿素	8-(2)-2923
30002	（３S，４R）-４-（3-フルオロフェニル）-１-（2-メトキシエチル）ピロリジン-３-カルボキシアミド	8-(1)-4565
30003	４-フルオロ-５-［(２S）-２-メチル-1，４-ジアゼパン-１-スルホニ	8-(2)-2924

	ル］イソキノリン	
30004	プロパ－２－エンニトリル・２－メチルプロパ－２－エンニトリル共重合物	9-4017
30005	４－（プロパン－２－イル）ベンゼン－１－チオール	4-(10)-1513
30006	４，４’－（プロパン－２，　２－ジイル）ビス［２，６－ビス（メトキシメチル）フェノール］を主成分とするコ４，４　－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・ホルムアルデヒド重縮合物］とメタノールの縮合反応生成物	10-4186
30007	２－ブロモ－１－ニドロ－４－フェノキシ－３－（トリフルオロメチル）ベンゼン	4-(12)-989
30008	４－ブロモ－５－ヒドロキシ－１－［(プロパン－２－イル）アミカアントラセン－９，10－ジオン	6-353
30009	４－（３－ブロモフェニル）－９－フェニル－９Ｈ－カルバゾール	8-(1)-4566
30010	（４Ｒ）－２－ブロモ－７－｛[tert－ブチルジ（フェニル）シリル］オキシ｝ヘプタ－１－エン－４－イル＝４－メチルベンゼン－１－スルホナート	4-(3)-246
30011	rac－（４Ｒ）－２－ブロモ－７－｛[tert－ブチルジ（フェニル）シリル］オキシ｝ヘプタ－１－エン－４－オール	4-(3)-247
30012	３　－ブロモプロパ－１－インと（ホルムアルデヒド・３－メチルフェノール重縮合物）の反応生成物	10-4187
30013	rac－（４Ｒ）－６－ブロモヘプタ－６－エン－１，４－ジオール	2-(8)-921
30014	３－｛[（３Ｚ）－ヘキサ－３－エン－１－イル］オキシ｝プロパンニトリル	2-(6)-2170
30015	（２Ｓ）－２－｛５－［５－（ベンジルオキシ）－１Ｈ－ピラゾール－３－イル］－１Ｈ－イミダゾール－１－イル｝プロパン－１－オール	8-(2)-2925
30016	３－（ベンジルオキシ）－６－ブロモ－２－ニトロフェノール	4-(10)-1514
30017	５－（ベンジルスルファニル）－１Ｈ－テトラゾール	8-(3)-1574
30018	ベンゼン－１，３，５－トリチオール	4-(10)-1515
30019	（２Ｓ，３Ｓ）－３－（メタンスルホンアミド）－２－［(２，３’，５’－トリフルオロ［１，１’－ビフェニル］－３－イル）メチル］ピロリジン－１－イウム＝クロリド	8-(1)-4567
30020	メタンスルホン酸－５－［(２－アミノピリジン－４－イル）オキシ］－６－（２－メトキシエトキシ）－Ｎ－メチル－１Ｈ－インドール－１－カルボキシアミド（１／１）	8-(1)-4568
30021	メチル= ３，５－ジクロロ－４－ヒドロキシベンゾアート	4-(7)-2713
30022	メチル= ３，５－ジクロロ－４－メトキシベンゾアート	4-(7)-2714
30023	２－メチル－４－(２，２，３－トリメチルシクロペンタ－３－エン－１－イル）ブタン－１－オール	3-(3)-227
30024	１－メチル－４－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］ピペラジン	8-(2)-2926
30025	Ｎ－メチル－４－ノナデシル－Ｎ－オクタデシルアニリン	4-(12)-990
30026	２－メチル－４－フェニル－１，３－ジオキソラン	8-(5)-550
30027	２－メチルプロピル＝２－シアノ－３－（４－ヒドロキシフェニル）プロパ－２－エノアート	4-(7)-2715
30028	４－メチル－３－（２－メチルピリミジン－５－イル）－１－フェニル－１Ｈ－ピラゾール－５－アミン	8-(2)-2927
30029	Ｎ－［４－メチル－３－（２－メチルピリミジン－５－イル）－１－フェニル－１Ｈ－ピラソール－５－イル］－１Ｈ－イミダゾール－１－カルボキシアミドを主成分とする，ジ（１Ｈ－イミダゾール－１－イル）メタノンと４－メチル－３－（２－メチルピリミジン－５－イル）－１－フェニル－１Ｈ－ピラゾール－５－アミンの反応生成物	8-(2)-2928

30030	４，４’－メチレンビス（３－ヒドロキシナフタレン－２－カルボン酸）のモノ（又はビス）（４－メチル－２－スルホフェニル）ジアゼニル化反応生成物のカルシウム塩	7-(4)-1433
30031	４－｛［６－（２－メトキシエトキシ）－１Ｈ－インドール－５－イル］オキシ｝－Ｎ－（２，４，４－トリメチルベンタン－２－イル）ピリジン－２－アミン	8-(1)-4569
30032	６－（２－メトキシエトキシ）－１Ｈ－インドール－５－オール	8-(1)-4570
30033	６－（２－メトキシエトキシ）－Ｎ－メチル－５－（｛２－［(２，４，４－トリメチルベンタン－２－イル）アミノ］ピリジン－４－イル｝オキシ）－１Ｈ－インドール－１－カルボキシアミド	8-(1)-4571
30034	１－メトキシ－５－［(プロパン－２－イル）アミノ］アントラセン－９，１０－ジオンを主成分とする，９，10－ジオキソ－５－［(プロパン－２－イル）アミノ］－９，10－ジヒドロアントラセン－１－スルホン酸とメタノールの反応生成物	6 -354
30035	１－（２－メトキシプロパン－２－イル）－４－メチルシクロヘキサン	3 -(4)-842

********** 以上 **********