ACSES ニュースレター_２３８８号（2022 年 9 月 28 日）

発行：NPO 法人教育研究機関化学物質管理ネットワーク（ACSES）事務局

―目次（13 頁）―

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示第 299 号）〈官報〉

梅檀草（センダングサ）

****

□ 労働安全衛生法第五十七条の四第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件（厚生労働省告示第 299 号）

［官報］ 令和 4 年 9 月 27 日 号外 第 205 号 1～8 頁

https://kanpou.npb.go.jp/20220927/20220927g00205/20220927g002050001f.html

〇厚生労働省告示第 299 号

労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）第五十七条の四第一項に規定する新規化学物質について同項の規定による届出があつたので、同条第三項の規定に基づき、その名称を次のとおり公表する。

令和 4 年 9 月 27 日　　厚生労働大臣　　加藤　勝信

通し番号	名　　称	整理番号
30266	［アガロースと（クロロメチル）オキシランの架橋反応生成物］とナトリウム＝３－（オキシラニルメトキシ）プロパン－１－スルホナートのエーテル化反応生成物	11-(4)-1001
30267	［アガロースと（クロロメチル）オキシランの架橋反応生成物］と（フェノキシメチル）オキシランのエーテル化反応生成物	11-(4)-1002
30268	{［アガロースと（クロロメチル）オキシランの架橋反応生成物］と２，２’－［ブタン－14－ジイルビス（オキシメチレン)］ビス（オキシラン）のエーテル化反応生成物}とアルカリ耐性組換えプロテインＡの付加反応生成物	11-(4)-1003
30269	［N[1]，N[1]’－［アザンジイルジ（エタン－２，１－ジイル)］ジ（エタン－１，２－ジアミン）と（不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られるタイマー酸(C=36 を主成分とする。)）のアミド化反応生成物}と２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアートの付加反応生成物	3-(4)-844
30270	Ｎ－アセチル－Ｌ－システインとアンモニアと(２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，７－トリデカフルオロヘプチル）オキシランの反応生成物	2-(4)-1364
30271	アダマンタン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロプロパン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4061
30272	{２－({４’－［(１－アニリノ－１，３－ジオキソブタン－２－イル）ジアゼニル］－３，３’－ジクロロ［1，1’－ビフェニル］－４－イル}ジアゼニル）－Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－３－オキソブタンアミドと 2，2’－［(３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジイル）ビス（ジアゼンジイル)］ビス（３－オキソ－	7-(3)-1157

	Ｎ－フェニルブタンアミド）と２，２’－［（３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジイル）ビス（ジアゼンジイル)］ビス［Ｎ－（２，４－ジメチルフェニル）－３－オキソブタンアミド]｝を主成分とする，３－オキソ－Ｎ－フェニルブタンアミドと（３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミンのジアゾ化反応生成物）とＮ－（２，４－ジメチルフェニル）－３－オキソブタンアミドの反応生成物	
30273	３－アミノ－６－クロロピリジン－２－カルボン酸	8-(1)-4588
30274	３－アミノシクロペンタ－２－エン－１－オン	3-(3)-228
30275	２－アミノ－３，５－ジョード安息香酸	4-(4)-1467
30276	α－（１－アミノプロパン－２－イル）－ω－［（１－アミノプロパン－２－イル）オキシ］ポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］・α－（２－アミノプロピル）－ω－メトキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］・エタン－１，２－ジアミン・［(不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られるタイマー酸(C=36 を主成分とする。)）の水素化反応生成物］重縮合物	10-4221
30277	（２Ｒ）－２－アミノ－３－メチルブタン－１－オール	2-(8)-926
30278	（２Ｓ）－２－アミノ－３－メチルブタン－１－オール	2-(8)-927
30279	（α，α’－［(アルキル（牛脂由来）（又はアルケニル（牛脂由来)）アザンジイル）ジ（エタン－２，１－ジイル)］ビス｛ω－［（２－エチルヘキサノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)｝を主成分とする，α，α’－［(アルキル（牛脂由来戸又はアルケニル（牛脂由来)）アザンジイル）ジ（エタン－２，１－ジイル)］ビス［ω－ヒドロキシポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)］と２－エチルヘキサン酸の反応生成物戸主成分）と［２－エチルヘキサン酸と２，２’，２”－ニトリロトリ（エタン－１－オール）のエステル化反応生成物］とオクタン－１－オールとデカン－１－オールの混合物の水溶液	10-4222
30280	［安息香酸ペルオキシ無水物を開始剤とする，エテニル（エチル）ベンゼン・エテニルベンゼン・ジエテニルベンゼン共重合物］のスルファニル化反応生成物（環置換に限る。）	9-4062
30281	アンモニアとスルファニルブタンニ酸と（２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，７-トリデカフルオロヘプチル）オキシランの反応生成物	2-(4)-1365
30282	α－（イコシル，オクタデシル及びドコシルを主成分とする，アルキル（C=18～22)）－ω－［（２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル)・エチル＝プロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物	9-4063
30283	５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２－イソシアナトエチル＝プロパ－２－エノア－ト・［１，１’－(シクロヘキサン－14－ジイル）ジメタノール・ジメチル＝カルボナート・ヘキサン－１，６－ジオール重縮合物］重付加物	10-4223
30284	｛［５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・２－エチル－２－（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオール・α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ（オキシブタン－14－ジイル)・(両末端にヒドロキシ基を有する，ブタ－１，３－ジエン重合物）重付加物］・５，５－ジメチル－３，７－ジオキサ－１，９(２)－ビス（オキシラナ）－４，６(１，４)－ジベンゼナノナファン・４，４’－(プロパン－２，２－ジイル）ビス［２－（プロパ－２－エン－１－イル）フェノール］重付加物｝と５，５－ジメチル－３，７－ジオキサ－１，９（２）－ビス（オキシラナ）－４，６(１，４)－ジベンゼナノナファンの混合物	10-4224
30285	５－イソシアナト－１－（イソシアナトメチル）－１，３，３－トリメチルシクロヘキサン・［５，５’－オキシビス（２－ベンソフラン－１，３－ジオン)・(不飽和脂肪酸（Ｃ＝18）の二量体として得られるタイマー酸（C=３６を主成分とする。）を還元しアミノ	10-4225

	化して得られるダイマージアミン（カルボキシ基をアミノメチル基にしたものに限る。))・４，４’-（９Ｈ-フルオレン-９，９-ジイル）ジアニリン重縮合物］重縮合物	
30286	５-イソシアナト-１-（イソシアナトメチル）-１，３，３-トリメチルシクロヘキサン・（１，３-ジオキソラン-２-オン・ヘキサン-１，６-ジオール・ベンタン-１，５-ジオール重縮合物）・２，２-ジメチルプロパン-１，３-ジオール・{プロパ-２-エン酸と２，２’-［プロパン-１，２-ジイルビス（オキシメチレン）］ビス（オキシラン）のエステル化反応生成物｝重付加物	10-4226
30287	５-イソシアナト-１-（イソシアナトメチル）-１，３，３-トリメチルシクロヘキサン・トリス（６-イソシアナトヘキシル）-１，３，５-トリアジナントリオン・２-ヒドロキシエチル＝プロパ-２-エノアート・α-（４-ヒドロキシブチル（又は３-ヒドロキシ-２-メチルプロピル））-ω-ヒドロキシポリ［オキシカルボニルオキシブタン-１，４-ジイル／オキシカルボニルオキシ（２-メチルプロパン-１，３-ジイル)］・プロパン-１，３-ジオール重付加物	10-4227
30288	（{［５-イソシアナト-１-（イソシアナトメチル）-１，３，３-トリメチルシクロヘキサンの環状三量体］重付加物｝と｛２-エチルヘキシル＝（６-イソシアナトヘキシル）［(６-イソシアナトヘキシル）カルバモイル］カルバマートを主成分とする，２-エチルヘキサン-１-オールと１，６-ジイソシアナトヘキサンの反応生成物｝と［トリス（６-イソシアナトヘキシル）-１，３，５-トリアジナントリオン重付加物］とα，α’，α”-（プロパン-１，２，３-トリイル）トリス｛ω-ヒドロキシポリ［オキシエタン-１，２-ジイル／オキシ（メチルエタン-１，２-ジイル)］｝の付加反応生成物）と３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８-トリデカフルオロオクタン-１-オールと２-（ヒドロキシメチル）-２-｛［(プロパ-２-エノイル）オキシ］メチル｝プロパン-１，３-ジイル＝ジ（プロパ-２-エノアート）とα-［ブチルジ（メチル）シリル］-ω-（{［３-（２-ヒドロキシエトキシ）プロピル］ジ（メチル）シリル｝オキシ）ポリ［オキシ（ジメチルシランジイル)］の付加反応生成物	10-4228
30289	インジウム＝ジアセタート＝ヒドロキシド	1-(1)-826
30290	エタン-１，２-ジオール・ジメチル＝ペンゼン-14-ジカルボキシラート・（不飽和脂肪酸（Ｃ＝18 を主成分とする。）の二量体として得られるタイマー酸(C=36 を主成分とする。）を還元して得られるダイマージオール（カルボキシ基をヒドロキシメチル基にしたものに限る。)）重縮合物	10-4229
30291	［エタン-１，２-ジオール・トール油脂肪酸・２，２-ビス（ヒドロキシメチル）プロパン-１，３-ジオール・２-ベンゾフラン-１，３-ジオン・ロジン重縮合物］とフラン-２，５-ジオンのエステル化反応生成物	10-4230
30292	{［エタン-１，２-ジオール・トール油脂肪酸・２，２-ビス（ヒドロキシメチル）プロパン-１，３-ジオール・２-ベンゾフラン-１，３-ジオン・ロジン重縮合物］とフラン-２，５-ジオンのエステル化反応生成物｝・エテニルトリ（エトキシ）シラン・２-（ジエチルアミノ）エチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・３-（トリメトキシシリル）プロピル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・ブチル＝プロパ-２-エノアート・ブチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート・４-｛２-［(２-メチルプロパ-２-エノイル）オキシ］エトキシ｝-４-オキソブタン酸・メチル＝２-メチルプロパ-２-エノアート共重合物	9-4064
30293	（{［エタン-１，２-ジオール・トール油脂肪酸・２，２-ビス（ヒドロキシメチル）プロパン-１，３-ジオール・２-ベンゾフラン-１，３-ジオン・ロジン重縮合物］とフラン-２，５-ジオンのエステル化反応生成物｝・エテニルトリ（エトキシ）シラ	9-4065

	ン・２－（ジエチルアミノ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３－（トリメトキシシリル）プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・４－｛２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ｝－４－オキソブタン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）と（テトラメチル＝シリカート重縮合物）の縮合反応生成物	
30294	エチル＝２－（アミノメチリデン）－６，６，６－トリフルオロ－５－オキソヘキサ－３－エノアート	2-(6)-2176
30295	エチル=２，２－ジフルオロ－３－ヒドロキシ-４-メチルペンタノアート	2-(6)-2177
30296	エチル＝２－［(ジメチルアミノ）メチリデン］－６，６，６－トリフルオロ－５－オキソヘキサ－３－エノアート	2-(6)-2178
30297	rac－（４Ｒ，４ａＲ，８Ｒ，８ａＲ）-４-エチル－８，８ａ－ジメチルオクタヒドロナフタレン－１(２Ｈ)－オンと rac－（４Ｒ，４ａＲ，８Ｓ，８ａＲ）－４－エチル－８，８ａ－ジメチルオクタヒドロナフタレン－１(２Ｈ)－オンと rac－（４Ｒ，４ａＳ，８Ｒ，８ａＳ）-４-エチル－８，８ａ－ジメチルオクタヒドロナフタレン－１(２Ｈ)－オンと rac－（４Ｒ，４ａＳ，８Ｓ，８ａＳ）－４-エチル－８，８ａ－ジメチルオクタヒドロナフタレン－１(２Ｈ)－オン（主成分）の混合物	7-(1)-1045
30298	エチル=６－（４，４－ジメチルシクロヘキサ－１－エン－１－イル）－２－メチルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン-４-カルボキシラート	8-(2)-2956
30299	Ｎ－エチル－Ｎ，Ｎ－ジメチル－２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エタン－１－アミニウム＝エチル＝スルファート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－メチル－ω－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ（オキシエタン－１，２－ジイル）共重合物	9－4066
30300	エチル＝６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－カルボキシラート	8-(1)-4589
30301	２－エチル－１－｛４－［１０－（ナフタレン－２－イル）アントラセン－９－イル］フェニル｝－１Ｈ－１，３－ベンゾイミダゾール	8-(2)-2957
30302	エチル＝ヒドラジニルアセタート一塩化水素（１／１）	2-(6)-2179
30303	｛９－エチル－６－［１－（ヒドロキシイミノ）エチル］－９Ｈ－カルバゾール－３－イルロ｝（２－メチルフェニル）メタノン	8-(1)-4590
30304	（２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・エテニル＝アセタート・プロパ－２－エン酸共重合物）と（｛２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］の１：４エーテル｝とプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成物）の光ラジカル反応生成物	9-4067
30305	（２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・メチル＝プロパ－２－エノアート共重合物）と（｛２，２－ビス（ヒドロキシメチル）プロパン－１，３－ジオールと α－ヒドロ－ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］の１：４エーテル｝とプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成物）の光ラジカル反応生成物	9-4068
30306	１－［９－エチル－６－（２－メチルベンゾイル）－９Ｈ－カルバソール－３－イル］エタン－１－オン	8-(1)-4591
30307	｛［(エテニル＝アセタート・エテノール共重合物）とブタナールのアセタール化反応生成物］と２－メチルプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成物｝・［(セルロースのエチルエーテル化反応生成物）と２－メチルプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成	11-(4)-1004

	物]・２－メチルプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	
30308	［エテニル（エチル）ベンゼン・ジエテニルベンゼン・4－（２－メチルブタン－２－イル）フェノール重付加物］・ベンゼン－１，３－ジカルボニル＝ジクロリド重縮合物	10-4231
30309	［エテニルジ（メチル）シラノール・トリメチルシラノール・(ヒドロキシ基を有する，二酸化ケイ素）重縮合物］と１，１，３，３－テトラメチルジシロキサンの付加反応生成物	10-4232
30310	（４－エテニルフェノール重合物）とエトキシエテンと１，４－ビス［(エテニルオキシ）メチル］シクロヘキサンのアセタール化反応生成物	9-4069
30311	４－エテニルフェノール・tert－ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ベンジル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4070
30312	１－エトキシ－２，２－ジフルオロ－４－メチル－１－オキソペンタン－３－イル＝２，３，５－トリヨードベンソアート	4-(7)-2722
30313	４，４’－オキシジアニリン・５，５’－オキシビス（２－ベンソフラン－１，３－ジオン)・［５，５’－ビ－２－ベンソフラン］－１，１’，３，３’－テトラオン・ベンゼン－１，４－ジアミン重付加物	10-4233
30314	２，２’－オキシジ（エタン－１－スルホン酸）	2-(4)-1366
30315	１，１’－オキシジ（プロパン－２－オール）とセイヨウスイレン（Nymphaea alba）花抽出物とナトリウム＝１－ヘキサデカノイル－Ｌ－フロリナートとブタン－１，３－ジオールとプロピル＝４－ヒドロキシベンソアートとメチル＝４－ヒドロキシベンゾアートの混合物の水溶液	11-(4)-1005
30316	オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと tert－ブチル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とし，３－スルファニルプロパン酸を連鎖移動剤とする，１－シクロヘキシル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・ジメチル=２，２’－［オキシビス（メチレン)］ジ（プロパ－２－エノアート)・ドデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルプロパ－２－エン酸共重合物（分子内環化反応生成物を含むものに限る。)｝のエステル化反応生成物	9-4071
30317	オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアートと（ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・４－｛２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ｝－４－オキソブタン酸・２－メチルプロパ－２－エン酸・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）のエステル化反応生成物	9-4072
30318	２－（３－オキソシクロペンタ－１－エン－１－イル）－１Ｈ－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオン	8-(1)-4592
30319	２－［(１Ｓ）－３－オキソシクロペンチル］－１Ｈ－イソインドール－１，３（２Ｈ）－ジオン	8-(1)-4593
30320	５－オキソ－５－［４－（フェニルスルファニル）フェニル］ペンタン酸と５，５’－［スルファンジイルジ(４，１－フェニレン)］ビス（５－オキソペンタン酸）の混合物	4-(4)-1468
30321	２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５－メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル＝クロロアセタート	8-(4)-2207
30322	［オキソラン－２，５－ジオンと（コラーゲンの加水分解反応生成物）のアミド化反応生成物］と(５Ｒ）－５－［(１Ｓ）－１，２－ジヒドロキシエチル］－４－ヒドロキシ－２－オキソ－２，５－ジヒドロフラン－３－イル＝二水素＝ホスファートのエステル化反応生成物のナトリウム塩	11-(4)-1006
30323	オクタ－２－エン－４－オン	2-(8)-928
30324	過マンガン酸カリウムとグラファイトと硫酸の反応生成物	12-1221
30325	α－（カルボキシメチル）－ω－（オクタデシル（又はヘキサデシル）オキシ）ポリ［オ	10-4234

	キシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］を主成分とする，｛ナトリウム＝クロロアセタートと α－ヒドロ－ω－（オクタデシルオキシ）ポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］と α－ヘキサデシル－ω－ヒドロキシポリ［オキシエタン－１，２－ジイル／オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］の反応生成物｝の弱酸遊離反応生成物	
30326	グルコース１－デヒドロゲナーゼ（ＦＡＤ，キノンバノ）(Aspergillus sp.)	11-(2)-278
30327	｛［(クロロメチル）オキシランと（２－ヒドロキシベンズアルデヒド・フェノール重縮合物）の縮合反応生成物］とプロパ－２－エン酸のエステル化反応生成物｝とスルファニル酢酸の付加反応生成物	10-4235
30328	［(クロロメチル）オキシラン・４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール重縮合物］・(１，３－ジイソシアナト－２－メチルベンゼンと２，４－ジイソシアナト－１－メチルベンゼンとヒマシ油の付加反応生成物)・(１，３－ジイソシアナト－２－メチルベンゼンと２，４－ジイソシアナト－１－メチルベンゼンと α，α，a″－（プロパン－１，２，３－トリイル）トリス｛ω－ヒドロキシポリ［オキシ（メチルエタン－１，２－ジイル)］｝の付加反応生成物)・［(12Ｒ）－12－ヒドロキシオクタデカン酸を主成分とする，ヒマシ油脂肪酸の水素化反応生成物］・［(４－tert－ブチルフェノキシ)メチル］オキシラン重付加物	10-4236
30329	１－（４－クロロ－２－メチルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－６－イル）－４，４－ジメチルシクロヘキサン－１－オール	8-(2)-2958
30330	ケイ素，酸素，炭素及び窒素からなる焼成物（$C_{100-(x+y+z)}N_xO_ySi_z$，0.05≦ｘ≦２、３≦ｙ≦21、２≦ｚ≦13)	1-(3)-487
30331	｛４，11－ジアセチル－７^2，８^3－ジクロロ－３，12－ジオキソ－２，５，６，９，10，13－ヘキサアザ－１，14（１），７，８（１，４）－テトラベンゼナテトラデカファン－５，９－ジエン－14，14^4－ジカルボキシアミドと４,11－ジアセチル－７^2，８^3－ジクロロ－14^2，14^4－ジメチル－３，12－ジオキソ－２，５，６，９，10,13－ヘキサアザ－１，14（１），７，８（１^4）－テトラベンゼナテトラデカファン－５,９－ジエン－14－カルボキシアミドと２，２’－［(３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジイル）ビス（ジアゼンジイル)］ビス［Ｎ－(２，４－ジメチルフェニル）－３－オキソブタンアミド]｝を主成分とする，４－（３－オキソブタンアミド)ベンズアミドと(３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミンのジアゾ化反応生成物）とＮ－(２，４－ジメチルフェニル）－３－オキソブタンアミドの反応生成物	7-(3)-1158
30332	１，１’－ジアゼンジイルジ（シクロヘキサン－１－カルボニトリル）及び２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルブタンニトリル）を開始剤とする，エテニルベンゼン・ドデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4073
30333	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルブタンニトリル)，２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）及び tert－ブチル＝２－エチルヘキサンペルオキソアートを開始剤とする，アルキル(Ｃ ＝ 12，13､直鎖型及び分枝型）＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・エテニルベンゼン・２－ヒドロキシエチル＝プロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル＝プロパ－２－エノアート・２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート・ブチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・α－｛２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル｝－ω－ヒド	9-4074

	ロキシポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル)］・２－メチルプロパ－２－エン酸・２－メチルプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・４－メトキシ－４－オキソブタ－２－エン酸共重合物	
30334	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルブタンニトリル）を開始剤とする，オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，８，８，８－トリデカフルオロオクチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－ヒドロキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－［４－（２－ヒドロキシ－２－メチルプロパノイル）フェノキシ］エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4075
30335	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルブタンニトリル）を開始剤とする，２－［２－（６－ヒドロキシ－２Ｈ－１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）－２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－５－イル］エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4076
30336	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，２－（アダマンタン－１－イル）プロパン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソ－２－［(２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５ －メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル）オキシ］エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５ －メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－（プロパン－２－イル）シクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4077
30337	２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパンニトリル）を開始剤とする，２－オキソ－２－［(２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５－メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル）オキシ］エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・（２－オキソ－１，３－ジオキソラン－４－イル）メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５－メタノシクロベンタ［ｂ］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－メチルアダマンタン－２－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4078
30338	１，４－ジイソシアナトブタン	2-(7)-382
30339	N^1，N^4－ジ（オクタデシル）ベンゼン－１，４－ジカルボキシアミドとメチル＝４－（イコシルカルバモイル）ベンソアートとメチル＝４－（オクタデシルカルバモイル）ベンソアート（主成分）とメチル＝４－（ヘキサデシルカルバモイル）ベンソアートの混合物	4-(7)-2723
30340	Ｎ－シクロヘキシルシクロヘキサンアミニウム＝Ｎ－［(ベンジルオキシ）カルボニル］－Ｌ－イソロイシナート	3-(4)-845
30341	［(１－シクロヘキシル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・１－フェニル－１Ｈ－ピロール－２，５－ジオン・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物）と１，３－ジヒドロキシプロパン－２－イル＝オクタデカノアートと２，３－ジヒドロキシプロピル＝オクタデカノアートとトリス(２，４－ジ－tert－ブチルフェニル）＝ホスフィットと２，２-ビス（{［３－（３，５－ジ－tert－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパノイル］オキシ} メチル）プロパン－１，３－ジイル＝ビス［３－（３，５－ジ－tert－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロパノアート］の混合物］製造時の脱揮工程における回収物の蒸留残渣	12-1222
30342	シクロ（ポリ｛アザニルイリデン［ビス（４－エテニルフェノキシ）－λ^5－ホスフア	10-4237

	ニルイリデン］／アザニルイリデン（ジフェノキシ－λ^{5}－ホスファニルイリデン）／アザニルイリデン［(４－エテニルフェノキシ)（フェノキシ）－λ^{5}－ホスファニルイリデン］})	
30343	シクロ［ポリ（６Ｈ－６λ^{5}－ジベンソ［ｃ，ｅ］［１，２]オキサホスフィニン－６－イル－６－イリデンアザニルイリデン)］を主成分とする，アンモニアと塩素と６－クロロ－６Ｈ－ジベンゾ［ｃ，ｅ］［１，２］オキサホスフィニンの反応生成物	10-4238
30344	３－(３，５－ジクロロ－４－ヒドロキシベンゾイル）－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－１λ^{6}，３－ベンソチアアソール－１，１－ジオン	8-(7)-2044
30345	{２，２’－［(３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジイル）ビス（ジアゼンジイル)］ビス［Ｎ－（２－メチルフェニル）－３－オキソブタンアミド］と２，２’－［(３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジイル）ビス（ジアゼンジイル)］ビス［Ｎ－（４－メチルフェニル）－３－オキソブタンアミド］と２－［(３，３’－ジクロロ－４{［１－（２－メチルアニリノ）－１，３－ジオキソブタン－２－イル］ジアゼニル}［１，１’－ビフェニル］－４－イル）ジアゼニル］－Ｎ－（４－メチルフェニル）－３－オキソブタンアミド} を主成分とする，(３，３’－ジクロロ［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミンのジアゾ化反応生成物）とＮ－（２－メチルフェニル）－３－オキソブタンアミドとＮ－（４－メチルフェニル）－３－オキソブタンアミドの反応生成物	7-(3)-1159
30346	３，５－ジクロロ－４－メトキシベンゾイル＝クロリド	4-(7)-2724
30347	３－(３，５－ジクロロ－４－メトキシベンゾイル)－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－１λ^{6}，３－ベンゾチアアゾール－１，１－ジオン	8-(7)-2045
30348	ジフェニル＝カルボナート・［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジオール・４，４’－(プロパン－２，２－ジイル）ジフェノール・４，４’－(プロパン－２，２－ジイル）ビス（２－メチルフェノール）重縮合物	10-4239
30349	ジ（プロパ－２－エン－１－イル）テトラスルファンとジ（プロパ－２－エン－１－イル）トリスルファン（主成分）の混合物	2-(12)-337
30350	ジベンジル＝（３Ｓ，６Ｓ，14Ｓ，17Ｓ）－９－ホルミル－10－ヒドロキシ－６，14－ジメチル－９，11－ビス（２－メチルプロピル）－４，７，13，16－テトラオキソ－３，17－ジ（プロパン－２－イル）－２，５，８，12，15，18－ヘキサアザノナデカンジオアートとＮ－［(ベンジルオキシ）カルボニル］－Ｌ－バリル－Ｌ－アラニンとベンジル＝［(2S)－３－メチル－１－({(２Ｓ)－１－［(４－メチル－１－オキソペンタン－２－イル）アミノ］－１－オキソプロパン－２－イル} アミノ）－１－オキソブタン－２－イル］カルバマート (主成分) とベンジル＝［(２Ｓ)－４－メチル－１－{［(２Ｓ)－１－{［(２Ｓ)－４－メチル－１－オキソペンタン－２－イル］アミノ} －１－オキソプロパン－２－イル］アミノ} －１－オキソペンタン－２－イル］カルバマートとベンジル＝［(２Ｓ)－３－メチル－１－{［(２Ｓ)－１ －{［(２Ｓ)－４－メチル－１－{［(２Ｓ)－４－メチル－１－オキソペンタン－２－イル］イミノ} ペンタン－２－イル］アミノ} －１－オキソプロパン－２－イル］アミノ} －１－オキソブタン－２－イル］カルバマートの混合物	4-(6)-481
30351	ジメチル=２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，１－エチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソ－２－［(２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５－メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル）オキシ］エチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソヘキサヒドロ－２Ｈ－３，５－メタノシクロペンタ［ｂ］フラン－６－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合	9-4079

	物	
30352	ジメチル=２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，２－エテニルフェニル＝アセタート・４－エテニルフェニル＝アセタート・１－フェニルシクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4080
40353	ジメチル=２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，４－エテニルフェニル＝アセタート・シクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4081
30354	ジメチル=２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，２－エテニルフェノール・４－エテニルフェノール・１－フェニルシクロヘキシル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4082
30355	ジメチル=２，２’－ジアゼンジイルビス（２－メチルプロパノアート）を開始剤とする，オキシラニルメチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・２－オキソオキソラン－３－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－ブトキシエチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・メチル＝プロパ－２－エノアート共重合物	9-4083
30356	ジメチル=５，５’－［スルファンジイルジ(４，１－フェニレン)］ビス｛４－［(アセチルオキシ）イミノ］－５－オキソペンタノアート｝とメチル＝４－［(アセチルオキシ）イミノ］－５－オキソ－５－［４－（フェニルスルファニル）フェニル］ペンタノアートの混合物	4-(7)-2725
30357	ジメチル=５，５’－［スルファンジイルジ(４，１－フェニレン)］ビス（５－オキソペンタノアート）とメチル＝５－オキソ－５－［４－（フェニルスルファニル）フェニル］ペンタノアートの混合物	4-(7)-2726
30358	ジメチル=５，５’－［スルファンジイルジ(４，１－フェニレン)］ビス［４－（ヒドロキシイミノ）－５－オキソペンタノアート］とメチル＝４－（ヒドロキシイミノ）－５－オキソ－５－［４－（フェニルスルファニル）フェニル］ペンタノアートの混合物	4-(7)-2727
30359	１^{3}，３^{3}－ジメチル－２^{3}，２^{4}，２^{5}，２^{6}－テトラヒドロ－２^{2}H－［１^{1}，２^{1}：２^{1}，３^{1}－テルフェニル］－１^{4}，３^{4}－ジオール・２，２，３，３，４，４，５，５，６，６，７，７，７－トリデカフルオロヘプタン－１－オール・ナフタレン－１，４－ジカルボニル＝ジクロリド・ナフタレン－２，６－ジカルボニル＝ジクロリド・［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジオール重縮合物	10-4240
30360	３－［N，N－ジメチル－３－(３α，７α，12α－トリヒドロキシ－５β－コラン－24－アミド）プロパニル－１－アミニウムイル］プロパン－１－スルホナート	7-(1)-1046
30361	２，２’－ジメチル［１，１’－ビフェニル］－４，４’－ジアミン・テトラヒドロシクロブタ［１，２－c：３，４－C］ジフラン－１，３，４，６－テトラオン・２，２’－ビス（トリフルオロメチル）［１，１－ビフェニル］－４，４’－ジアミン重付加物	10-4241
30362	５，５－ジメチル－２－フェノキシ－１，３，２－ジオキサホスフィナン	8-(9)-195
30363	ジメチル＝ベンゼン－１，４－ジカルボキシラート・(デカン－１，10－ジオール重縮合物)・ブタン－１，４－ジオール重縮合物	10-4242
30364	ジメチル＝ベンゼン－１，４－ジカルボキシラート・ブタン－１，４－ジオール・(不飽和脂肪酸(C=18 を主成分とする。）の二量体として得られるダイマー酸(C=36 を主成分とする。）を還元して得られるダイマージオール（カルボキシ基をヒドロキシメチル基にしたものに限る。)）重縮合物	10-4243
30365	｛N，N－ジメチル－２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エタン－１－アミニウムイル｝アセタート（主成分）と（２－ヒドロキシ－N，N－ジメチルエタン－１－アミニウムイル）アセタートの混合物	2-(2)-334
30366	（スルホナトフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^{4}N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}）銅酸（１－）	1-(1)-827

	オクタデカン－１－アミニウムを主成分とする，オクタデカン－１－アミンと［(フタロシアニン－29，31-ジイド－κ^{4}N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}）銅のスルホン化反応生成物］の塩	
30367	（スルホナトフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^{4}N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}）銅酸（１－）ドデカン－１－アミニウムを主成分とする，ドデカン－１－アミンと［(スルホナトフタロシアニン－29，31－ジイド－κ^{4}N^{29}，N^{30}，N^{31}，N^{32}）銅のスルホン化反応生成物］の塩	1-(1)-828
30368	テトラデカ－１－エン・ビス（２－エチルヘキシル）＝ブタ－２－エンジオアート・ヘキサデカ－１－エン共重合物	9-4084
30369	１，1，１，２－テトラフルオロプロパン	2-(13)-334
30370	［(３Ｚ)－３，７，11，15－テトラメチルヘキサデカ－１，３－ジエンと(３Ｅ)－３，７，11，15－テトラメチルヘキサデカ－１，３－ジエンと７，11，15－トリメチル－３－メチリデンヘキサデカ－１－エン］を主成分とする，３，７，11，15－テトラメチルヘキサデカ－１－エン－３－オールの脱水反応生成物	2-(1)-45
30371	(２Ｅ)－ドデカ－２－エナール	2-(8)-929
30372	ドデカン－１，12－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）（主成分）と12－ヒドロキシドデシル＝２－メチルプロパ－２－エノアートの混合物	2-(6)-2180
30373	３－［３－（トリエトキシシリル）プロピル］オキソラン－２，５－ジオン	8-(4)-2208
30374	４－［３－（トリエトキシシリル）プロピル］モルホリン	8-(7)-2046
30375	１，１，３－トリス［(エテニルフェニル）メチル］－１Ｈ－インデンを主成分とする，１Ｈ－インデンと（クロロメチル）（エテニル）ベンゼンの反応生成物	7-(1)-1047
30376	トリス［２，４－ジ（オキソ－κＯ）ペンタン－３－イド］ガリウム	1-(1)-829
30377	トリス（ジメチルフェニル（又はフェニル又はメチルフェニル））＝ホスフアートと４，４’－（プロパン－２，２－ジイル）ジフェノールのエステル交換反応生成物	7-(4)-1436
30378	１，１，１－トリフルオロ－Ｎ－フェニルメタンスルホンアミド	4-(8)-355
30379	（１ｒ，１’ｓ，４ｒ，４’ｒ）－４’－(４，４，４－トリフルオロブチル[1，1’－ビ（シクロヘキサン)］－４－カルボン酸	7-(3)-1160
30380	４－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－カルボキシアミド	8-(1)-4594
30381	４－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－カルボニル＝クロリド	8-(1)-4595
30382	６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－カルボン酸	8-(1)-4596
30383	６－(トリフルオロメチル）ピリジン－３－カルボン酸－メチル＝４－（エチルアミノ）ピリジン－３－カルボキシラート（11）	8-(1)-4597
30384	α－（トリメチルシリル）－ω－［(トリメチルシリル）オキシ］ポリ｛オキシ［メチル(３，３，４，４，５，５，６，６，６－ノナフルオロヘキシル）シランジイル］ノオキシ（メチルシランジイル)｝	10-4244
30385	Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチル－１－フェニルメタンアミニウム＝２，２－ジフルオロ－４－メチル－３－［(２，３，５－トリヨードベンゾイル）オキシ］ベンタノアート	4-(2)-405
30386	（{トリメトキシ［２－（７－オキサビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル）エチル］シランの加水分解反応生成物｝重縮合物）とα－ヒドロ－ω－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ポリ［オキシ（１－オキソヘキサン－１，６－ジイル)］と４－［(１ｓ，４ｒ）－４－ベンチルシクロヘキシル］安息香酸のエステル化反応生成物	10-4245
30387	２，３，５－トリヨード安息香酸	4-(4)-1469
30388	９－（ナフタレン－２－イル）アントラセン	7-(1)-1048
30389	［10－（ナフタレン－２－イル）アントラセン－９－イル］ボロン酸	7-(1)-1049
30390	ナフタレン－１，４－ジイル＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）	5-1579

30391	ナフタレン－２，３，６，７－テトラカルボン酸	5-1580
30392	１H，３H－ナフト［２，３－ｃ：６，７－ｃ］ジフラン－１，３，６，８－テトラオン	8-(4)-2209
30393	２，４－ビス（２－フェニルプロパン－２－イル）フェノール	7-(4)-1437
30394	ビス｛４－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ブチル}=(１^{1}ｒ，１^{4}ｒ，２^{1}ｒ，２^{4}ｒ，８^{1}ｒ，８^{4}ｒ，９^{1}ｒ，９^{4}ｒ)－５^{2}－アセチル－３，７－ジオキソ－４，６－ジオキサ－５(１，４)－ベンゼナ－１，９(１)，２，８(１，４)－テトラシクロヘキサナノナファン－１^{4}，９^{4}－ジカルボキシラート	7-(3)-1161
30395	ビス｛４－［(プロパ－２－エノイル）オキシ］ブチル｝＝(１^{1}ｒ，１^{4}ｒ，２^{1}ｒ，２^{4}ｒ，８^{1}ｒ，８^{4}ｒ，９^{1}ｒ，９^{4}ｒ)－５^{2}－メチル－３，７－ジオキソ－４，６－ジオキサ－５(１，４)－ナフタレナ－１，９(１)，２，８(１，４)－テトラシクロヘキサナノナファン－１^{4}，９^{4}－ジカルボキシラート	7-(3)-1162
30396	ビス｛２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル}=(１ｒ，１’ｒ，４ｒ，４’ ｒ)－［１，１’－ビ（シクロヘキサン)］－４，４’－ジカルボキシラート	7-(3)-1163
30397	６－（１－ヒドロキシ－４，４－ジメチルシクロヘキシル）－２－メチルチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４－カルボニトリル	8-(2)-2959
30398	９－（［１，１’－ビフェニル］－３－イル）アントラセン	7-(1)-1050
30399	１－［10－（［１，１’－ビフェニル］－３－イル）アントラセン－９－イル］ナフト［２，３－b］［１］ベンゾフラン	8-(4)-2210
30400	［10－（［１，１’－ビフェニル］－３－イル）アントラセン－９－イル］ボロン酸	7-(1)-1051
30401	９－（［１，１’－ビフェニル］－３－イル）－10－ブロモアントラセン	7-(1)-1052
30402	（［１，１’－ビフェニル］－３－イル）ボロン酸	7-(3)-1164
30403	［１，１’－ビフェニル］－４－カルボアルデヒド・ピレン－１－オール重縮合物	10-4246
30404	17－(ピリジン－３－イル）アンド□スタ－５，16－ジエン－３β－イル＝アセタート	8-(1)-4598
30405	１，３－フェニレンビス（メチレンアザンジイルカルボニルオキシプロパン－２，１－ジイル）＝ビス（２－メチルプロパ－２－エノアート）を主成分とする，１，３－ビス（イソシアナトメチル）ベンゼンと２－ヒドロキシプロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアートの付加反応生成物	4-(6)-482
30406	tert－ブチル＝（１R，５S，６r)－６－(５，５－ジメチル－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサアゾール－３－イル）－３－アザビシクロ［３．10］ヘキサン－３－カルボキシラート	8-(7)-2047
30407	N－ブチル－N’－［３－（トリメトキシシリル）プロピル］チオ尿素	2-(3)-600
30408	４－（４－tert－ブチルフェニル)－１，４－オキサチアン－４－イウム=1，１－ジフルオ□－２－オキソ－２－［(4’－オキソテトラヒドロスピロ［アダマンタン－２，２’－フロ［３，４－ｄ］［１，３］ジオキソール］－５－イル）オキシ］エタン－１－スルホナート	8-(8)-61
30409	tert－ブチル＝（３R，５S，６E)－７－［４－（４－フルオロフェニル）－２－（N－メチルメタンスルホンアミド）－６－(プロパン－２－イル）ピリミジン－５－イル］－３，５－ジヒドロキシヘプタ－６－エノアート	8-(2)-2960
30410	［フラン－２，５－ジオンと（プロパ－２－エン－１－イル）シクロペンタ－１，３－ジエンの反応生成物］の４（又は５又は８）－（プロパ－２－エン－１－イル）－３a，４，７，７a－テトラヒドロ－４，７－メタノ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオン精製時の蒸留残渣	12-1223
30411	［フラン－２，５－ジオンと（プロパ－２－エン－１－イル）シク□ベンダ－１，３－ジエンの反応生成物］の４（又は５又は８）－（プロパ－２－エン－１－イル）－３a，	12-1224

	４，７，７ａ－テトラヒドロ－４，７－メタノ－２－ベンゾフラン－１，３－ジオン精製時の前留分	
30412	（２Ｓ）－２－（｛［（９Ｈ－フルオレン－９－イル）メトキシ］カルボニル｝アミノ）－３－｛２－フルオロ－４－［(プロパ－２－エン－１－イル）オキシ］フェニル｝プロパン酸	7-(1)-1053
30413	９－ブロモ－10－（ナフタレン－２－イル）アントラセン	7-(1)-1054
30414	［ヘキサン－１，６－ジオールと α－（トリメチルシリル）－ω－［(トリメチルシリル）オキシ］ポリ（オキシ（ジメチルシランジイル）ノオキシ｛［３－（２，５－ジオキソオキソラン－３－イル）プロピル］（メチル）シランジイル｝ノオキシ［ヘキシル（メチル）シランジイル］）のエステル化反応生成物］と２－メチルウンデカンの混合物	10-4247
30415	Ｎ－［(ベンジルオキシ）カルボニル］－Ｌ－イソロイシン	4-(4)-1470
30416	２－ベンジル－５－ヒドロキシ－７－メチル－８－ニトロソ［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリジン－６－カルボニトリル	8-(1)-4599
30417	（１，３－ベンゾチアアゾール－３(２Ｈ)－イル）（３，５－ジクロロ－４－メトキシフェニル）メタノン	8-(7)-2048
30418	１，１，２，２，３－ペンタフルオロプロパン	2-(13)-335
30419	｛３－［(５（又は６）－エテニルビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル）スルファニル］プロピル｝トリ（エトキシ）シランを主成分とする，５－エテニルビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エンと３－（トリエトキシシリル）プロパン－１－チオールの反応生成物	7-(2)-399
30420	末端に｛３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル｝スルファニル基を有する，２－エチルヘキシル＝プロパ－２－エノアート・３－［ジメトキシ（メチル）シリル］プロピル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・ブチル＝プロパ－２－エノアート共重合物	9-4085
30421	末端に１－メトキシ－２－メチル－１－オキソプロパン－２－イル基を有する，４－エテニルフェノール・３－メチルシクロヘキサ－２－エン－１－イル＝２－メチルプロパ－２－エノアート・１－メチルシクロペンチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4086
30422	メチル＝２－アセトアミドベンゾアート	4-(7)-2728
30423	メチル＝２－（アミノメチリデン）－３－オキソブタノアート	2-(6)-2181
30424	メチル＝４－（エチルアミノ）ピリジン－３－カルボキシラート	8-(1)-4600
30425	メチル＝４－［Ｎ－エチル－６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－カルボキシアミド］ピリジン－３－カルボキシラート	8-(1)-4601
30426	メチル＝１－（クロロアセチル）－２－オキソ－２，３－ジヒドロ－1Ｈ－インドール－６－カルボキシラート	8-(1)-4602
30427	メチル＝４－クロロピリジン－３－カルボキシラート	8-(1)-4603
30428	１－（１－メチルシクロプロピル）－１Ｈ－イミダゾール－４－カルボン酸	8-(2)-2961
30429	１－メチルシクロペンチル＝５－エテニル－２－ヒドロキシベンゾアート	4-(7)-2729
30430	メチル＝３－｛３－［ジ（プロパン－２－イル）アミノ］－１－フェニルプロピル｝－４－ヒドロキシベンゾアート	7-(4)-1438
30431	（２－メチルピリミジン－５－イル）ボロン酸	8-(2)-2962
30432	｛(２Ｓ，４Ｓ）－４－［４－（３－メチル－１－フェニル－１Ｈ－ピラゾール－５－イル）ピペラジン－１－イル］ピロリジン－２－イル｝（１，３－チアアゾリジン－３－イル）メタノン一臭化水素（１／２）	8-(2)-2963
30433	２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エチル＝フェニル=（１ｒ，１’ｓ，	7-(3)-1165

	４ｒ，４’ｒ）－［1，1’－ビ（シクロヘキサン)］－４，４’－ジカルボキシラート	
30434	（１ｒ，１’ｓ，４ｒ，４’ｒ）－4’－({２－［(２－メチルプロパ－２－エノイル）オキシ］エトキシ} カルボニル)［1，1’－ビ（シクロヘキサン)］－４－カルボン酸	7-(3)-1166
30435	２－メチルプロパン－２－ベルオキソールを開始剤とする，エテニルベンゼン・ブチル＝プロパ－２－エノアート・プロパ－２－エンニトリル・メチル＝２－メチルプロパ－２－エノアート共重合物	9-4087
30436	４－メチルベンゼン－１－スルホン酸－N’－（９－ベンジル－９－アザビシクロ［3．3．1］ノナン－３－イリデン）－４－メチルベンゼン－１－スルホノヒドラジド（1／1）	8-(1)-4604
30437	６－（メトキシメチル）ジナフト［2，１－ｂ：1’，2’－ｄ］チオフェン	8-(6)-376

********** 以上 **********